


CHICAGO
NATURAL HISTORY
MUSEUM

THE FIELD MUSEUM LIBRARY



3 5711 00015 4311







Digitized by the Internet Archive
in 2012 with funding from
Field Museum of Natural History Library

REVUE COLÉOPTÉROLOGIQUE

PUBLIÉE PAR

CONSTANT VAN DEN BRANDEN

PREMIÈRE ANNÉE



BRUXELLES

CONSTANT VAN DEN BRANDEN

69, RUE DE LA MADELEINE

BERLIN

R. FRIEDLANDER & SOHN
BUCHHANDLUNG

CARLSTRASSE, 11. — (N.-W.)

1882



138149

REVUE COLÉOPTÉROLOGIQUE

PUBLIÉE PAR

Constant VAN DEN BRANDEN

ET PARAISSANT TOUS LES MOIS

PRIX D'ABONNEMENT : Par an : pour la Belgique, 8 francs; pour l'étranger, 10 francs.
— S'adresser, à Bruxelles, chez M. C. Van den Branden, 69, rue de la Madeleine, ou à Berlin, à la librairie R. Friedländer & Sohn, 11, Carlstrasse. —
Pour tous renseignements ou communications, s'adresser à M. C. Van den Branden.

AUX COLÉOPTÉRISTES.



Le nombre considérable de publications scientifiques qui paraissent aujourd'hui et la quantité de coléoptères dont les descriptions sont disséminées dans une foule de recueils, rendent de plus en plus difficile l'étude de ces insectes. Si l'on n'a pas à sa disposition une bibliothèque entomologique très riche, si l'on ne reçoit pas une quantité de publications périodiques, on ne peut plus se tenir au courant de la science. Combien d'auteurs n'ont pas décrit de "supposées espèces nouvelles" dont la description se trouvait déjà dans un travail dont ils n'avaient pas connaissance!

C'est dans le but de remédier autant que possible à ces inconvénients que je me suis décidé à publier la *Revue Coléoptérologique*, et je me plais à croire que les spécialistes sauront ainsi rechercher les travaux dont ils pourraient avoir besoin et, en même temps, reconnaître la véritable valeur des descriptions d'un grand nombre de Coléoptères nouveaux.

J'ai adopté, pour la *Revue Coléoptérologique*, les cinq divisions suivantes : I. BIBLIOGRAPHIE : Liste des ouvrages sur les coléoptères, parus pendant le mois précédent; les publications périodiques renfermant des travaux sur les coléoptères seront signalées

avec l'énumération de ces travaux. — II. ESPÈCES NOUVELLES : Catalogue des coléoptères nouveaux décrits durant le mois écoulé, avec indication des ouvrages et pages où se trouvent les descriptions, et habitat. — III. REMARQUES SYNONYMIQUES : Compte rendu de toutes les notes de ce genre qui auront été faites. — IV. NÉCROLOGIE. — V. COMMUNICATIONS DIVERSES : Collections, livres importants à vendre, ouvrages recommandés, nouvelles, etc., etc.

En prenant la résolution de publier la *Revue Coléoptérologique*, j'avais l'intention de donner les diagnoses latines des espèces et genres nouveaux; mais, après mûre réflexion, je me suis vu forcé d'abandonner ce projet.

Voici les causes de cette décision, au moins les principales : Beaucoup d'auteurs ont l'habitude de ne pas faire de diagnoses pour les coléoptères qu'ils décrivent : il faudrait donc, d'après la description faite en une langue quelconque, composer une diagnose latine renfermant les caractères essentiels. Comment trouver ceux-ci quand on n'a sous les yeux ni le type, ni les espèces voisines? D'ailleurs, quelle responsabilité! — D'autres auteurs (surtout les Anglais et les Américains), font des diagnoses en leur propre langue : nouvelle perte de temps considérable pour le traducteur. — D'autres, enfin, donnent des diagnoses d'une ou deux lignes : les reproduire, telles qu'elles sont, ne servirait évidemment à rien; ce n'est pas avec ces quelques mots que l'on pourrait déterminer une espèce, du moins dans l'immense majorité des cas.

On voit donc que, pour le moment, il est impossible de donner les diagnoses latines de tous les coléoptères nouveaux; un pareil travail ne sera praticable que lorsque tous les auteurs feront des diagnoses latines et que celles-ci seront assez longues pour permettre les déterminations.

C'est pourquoi je pense que les abonnés de la *Revue* ne m'en voudront pas d'avoir ainsi réduit mon premier plan.

Certes, il y aura dans la *Revue Coléoptérologique*, surtout dans les premiers numéros, des omissions dues à certains travaux que je n'aurais pas vus. **Afin d'éviter autant que possible ces omissions, je fais un nouvel appel aux auteurs et j'espère qu'ils voudront bien m'envoyer un exemplaire de leurs ouvrages ou notes sur les Coléoptères. J'adresse la même demande aux Sociétés, Musées et Rédacteurs de publications périodiques, qui recevront, à titre d'échange, la REVUE COLÉOPTÉROLOGIQUE.**

CONSTANT VAN DEN BRANDEN.

BIBLIOGRAPHIE.

The Entomologist, an Illustrated Journal of General Entomology; Vol. XV, N° 224; January 1882. — Entomological Notes, Captures, etc. Th. Wood, *Plagiodera armoraciæ*. — T.-H. Hart, The Genus *Phædon*.

The Entomologist's Monthly Magazine. — Vol. XVIII, N° 212; January 1882. — A.-E. Hodgson : Notes on the past season, and on the occurrence of certain Lepidoptera and Coleoptera in the forest of Dean. Id. : Rare Coleoptera in Scotland. — W.-W. Fowler : *Pterostichus vulgaris*, etc., in a frog's stomach. — G. Lewis : *Lebia crux-minor* in Japan. — The " *Revue Coléoptérologique* ". — Obituary : John Gray. — Proceedings of the Entomological Society of London : Oct. 5th. 1881; November 2nd 1882; December 7 th. 1881.

Feuille des Jeunes Naturalistes. — 12^e année, N° 135; 1^{er} janvier 1882. — E. Tarriel : Environs de Rouen; la Forêt-Verte; chasses entomologiques d'hiver. — Communications : Nouvelles Sociétés d'histoire naturelle; Note sur le Sud Oranais. — Bibliographie. Liste d'échanges. Échanges. Bulletin bibliographique de la Feuille des Jeunes Naturalistes. Ouvrages reçus.

Il Naturalista Siciliano, giornale di scienze naturali. — Anno I; N. 4; 1 Gennaio 1882. — G. Kraatz : *Polyphylla Ragusæ* nov. sp., avec une observation de E. Ragusa, p. 82. — F. Baudi : Note entomologica (*Cicindélides* et *Carabiques*), p. 83. — Notizie; Cenni Bibliografici, Entomologia.

The American Naturalist, devoted to the Natural Sciences in their widest sense. — January 1882; Vol. XVI, N° 1. — General Notes, Entomology : Clover Insects; Horn's Classification of the *Carabidæ*; Interest Felt in Economic Entomology in California. — Obituary : Comte de Mniszech.

La Nature, revue des sciences et leurs applications aux arts et à l'industrie, journal hebdomadaire illustré. — 10^e année; 14 janvier 1882. — Page 104 : le Scarabée Hercule, avec planche.

28 janvier 1882. — Page 142; Chronique : Destruction des insectes nuisibles.

Le Naturaliste, journal des échanges et des nouvelles, paraissant le 1^{er} et le 15 de chaque mois. — 4^e année, N^o 1; 1^{er} janvier 1882. — Bibliographie, p. 4. — J. Géhin : Carabus auronitens et ses variétés, p. 4. — Offres et demandes, p. 8.

Id. — N^o 2; 15 janvier 1882. — Chronique et nouvelles, p. 15. — Livres nouveaux, p. 16.

Société Entomologique de Belgique : Comptes-rendus des séances; Série III, N^o 14; Assemblée mensuelle du 7 janvier 1882. — Annonce du décès de M. J. Putzeys, discours prononcé à ses funérailles par M. J. Sauveur, membre de la Société; note de M. de Sélys-Longchamps relative aux débuts entomologiques de M. Putzeys. — A. Preudhomme de Borre : Note sur le Carabus cancellatus Illiger et sa var. fusus Palliardi. — Captures de Coléoptères rares en Belgique.

Société Entomologique de France. — 1882, N^o 1. — Avis très importants. — Bulletin des séances, paraissant deux fois par mois : Séance du 11 janvier 1882. — Annonce du décès de MM. Demoulin, Leprieur fils, Putzeys et Putnam. — Chevrolat : Diagnoses de trois Coléoptères nouveaux et remarques sur une quatrième espèce. — Résumé des récoltes entomologiques faites en Abyssinie par M. Achille Raffray (au moins 2,000 espèces de Coléoptères). — Bulletin bibliographique : Séance du 28 décembre 1881 (fin).

Id. — 1882, N^o 2. — Avis très importants. — Bulletin des Séances : Séance du 25 janvier 1882. — L. Fairmaire : Diagnose d'un Coléoptère du Gabon, de la famille des Colydiens. — L. von Heyden : Notes synonymiques. — Élections de membres honoraires : seul membre élu : M. Léon Fairmaire. — Bulletin bibliographique : Séance du 11 janvier 1882.

The Annals and Magazine of Natural History. — Fifth series; Vol. IX, N^o 49; January 1882. — Fr.-P. Pascoe : Notes on Coleoptera, with Descriptions of new Genera and species. Part IV, p. 25. — Ch.-O. Waterhouse : Descriptions of New Longicorn Coleoptera (Prionidæ and Lepturidæ) from Madagascar, p. 47. — Ch.-O. Waterhouse : Descriptions of New Buprestidæ, p. 50.

Bulletin de la Société des Naturalistes Dinantais. — Année 1881-82; II. — A. Preudhomme de Borre : Matériaux pour la Faune Entomologique de la province de Namur : Coléoptères,

1^{re} centurie, p. 73. — A. Lameere : Tableau synoptique des Clytus de Belgique et des pays voisins, p. 92. — A. Lameere : Tableaux synoptiques des Cérambycides de la tribu des Lepturiens qui se rencontrent en Belgique et dans les pays voisins, p. 94. — C. Van den Branden : Tableaux synoptiques des espèces belges du genre *Feronia* Latr., p. 99. — A. Bergé : Tableau synoptique des genres et des espèces de Buprestides de Belgique, p. 105.

ESPÈCES NOUVELLES.

1. *Polyphylla Ragusæ* Kraatz, Il Natur. Sicil. N. 4, 1882, p. 82. Sicile.
2. *Acinopus brevicollis* Baudi, Il Natur. Sicil. N. 4, 1882, p. 85. —
3. *Cebrio apicalis* Chevrolat, Bull. Soc. Ent. France, 1882, N° 1, p. 4. Espagne.
4. *Zonitis biimpressa* Chevr. l. c., p. 4. —
5. *Zonitis bipunctata* Chevr. l. c., p. 5. Damas.
6. *Aprostoma integriceps* Fairm., Bull. Soc. Ent. France, 1882, N° 2, p. 14. Gabon.
- 6^b. *Gempylodes superans* Pascoe, Ann. a. Mag. Nat. Hist., N° 49, janv. 1882, p. 26. Siam.
7. *Hylotastes terminatus* Pasc., l. c., p. 26. Bornéo.
8. DOTICUS (n. g.) Pascoe, l. c., p. 27. (Genre de la famille des Anthribidæ et voisin de *Aræocerus*.)
D. palmaris Pasc., l. c., p. 27. Queensland.
9. APOSTETHUS (n. g.) Pasc., l. c., p. 27 (fam. Tenebrionidæ, trib. Opatrinæ. (Genres voisins : *Opatrum*, *Achora*.)
A. terrenus Pasc., l. c., p. 28. —
10. *Blepegenes equestris* Pasc., l. c., p. 28. Nouv.-Galles du Sud.
11. TELETHRUS (n. g.) Pasc., l. c., p. 29 (fam. Tenebrionidæ, trib. Helopinæ. — Genres voisins : *Misolampus*, *Sphærotus*, *Osdara*.)
T. ebeninus Pasc., l. c., p. 29. Para.
12. *Micrantereus tentyrioides* Pasc., l. c., p. 29. Arabie.
13. *Camaria chlorizans* Pasc., l. c., p. 30. Para.
14. *Camaria clandestina* Pasc., l. c., p. 30. —
15. *Camaria decipiens* Pasc., l. c., p. 30. —
16. CALYDONIS (n. g.) Pasc., l. c., p. 31 (fam. Tenebrionidæ, trib. Cnodaloninæ. — Genre voisin : *Camaria*.)
C. refulgens Pasc., l. c., p. 31. Amazone, Para.
17. *C. cuprea* Pasc., l. c., p. 31. —

- Conognatha princeps* Thomson, Typi Buprest., = *C. princeps* Gory.
— *comitessa* Thomson, Typi Buprest.; semble être *C. Batesii* Saunders.

EX. PASCOE :

(Ann. a. Mag. of Nat. Hist., n° 49, January 1882, p. 28, note.)

Employez le nom de *Achora* Pascoe, au lieu de *Prionotus* Muls., nom donné longtemps auparavant par Cuvier à un genre de poissons et par Laporte à un genre d'Hémiptères.

EX. L. VON HEYDEN :

(Bull. Soc. Entom. de France, 1882, n° 2, p. 14 et suiv.)

- Hydræna pallidipennis* Cast. = *Ochthebius marinus* Payk.
— *striata* Cast. = *Ochthebius bicolor* Germ. (*rufo-marginatus* Steph.).

Remplacez le nom de *Mylabris* Fabr. (nec Geoffr.) par *Zonabris* Harold et rejetez *Megabris* Des Gozis.

Conservez les noms de genres *Corticus* et *Ctenopus*, en rejetant *Horrimantus* Des Gozis et *Sarandonyx* Des Gozis.

Mettez en synonymie de *Dactylorhinus* Tournier, le genre *Bornazon* Des Gozis.

NÉCROLOGIE.

JULES PUTZEYS.

La mort vient d'enlever à la science une des gloires de l'Entomologie : le 2 janvier dernier, Jules Putzeys s'est éteint à Bruxelles, à l'âge de 72 ans, 8 mois.

Dès sa première jeunesse, Putzeys consacra ses loisirs à l'étude de la faune et de la flore de la Belgique; plus tard, il s'occupa spécialement d'entomologie et fit des captures intéressantes dans tous les ordres d'insectes. Il ne tarda pas à se spécialiser davantage et, ayant partagé sa collection entre ses meilleurs amis, il ne conserva que les Cicindélites et Carabiques, dont il s'occupa toute sa vie.

En 1845, il publia quelques notes sur différents Carabiques, dans le *Stettiner Entomologische Zeitung*, en même temps que le tome II des Mémoires de la Société des Sciences de Liège contenait

ses *Prémices entomologiques* et sa *Monographie des Clivina et genres voisins*. A dater de cette époque, Putzeys publia une foule de notes et descriptions d'espèces nouvelles qui se trouvent pour la plupart dans le *Stettiner Entomologische Zeitung* et les *Annales de la Société Entomologique de Belgique*. De plus importants travaux parurent principalement dans les mêmes recueils, ainsi que dans l'*Abeille* et les *Mémoires de la Société des Sciences de Liège*.

Il serait trop long d'énumérer ici tous ces ouvrages; notons seulement que les principaux travaux de l'illustre Carabophile ont porté sur les Clivinides, Broscides, Calathides, Amaroides et Tréchides. — Il y a quelques mois à peine, il donnait, dans les comptes rendus des séances de la Société Entomologique de Belgique, une notice nécrologique sur le baron de Chaudoir.

Enlevé subitement à la science et à ses nombreux amis, Putzeys, renommé pour la précision scrupuleuse de ses travaux et sa bienveillance pour les adeptes de l'entomologie, laissera d'unanimes regrets dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu.

La famille, obéissant au vœu du défunt, a fait don des collections et de la bibliothèque de M. Putzeys à la Société Entomologique de Belgique. On connaît la grande valeur de cette collection, remplie de types d'une extrême rareté.

COMMUNICATIONS DIVERSES.

Société française d'Entomologie : tel est le titre d'une nouvelle société entomologique qui se constitue en France et dont les principales vues sont : de publier une Revue mensuelle, d'entreprendre une faune entomologique française, de créer une bibliothèque accessible à tous les membres, enfin, de former un comité d'étude pour aider les associés à déterminer leurs insectes (les noms des membres du comité de détermination seront indiqués dans la revue avec la spécialité de chacun). D'après le projet de statuts, la Société sera représentée par quatre délégués, dans autant de régions différentes; la cotisation des membres sera fixée à 12 francs par an; chaque année il y aura une session (séances et excursions), dans une région choisie par le bureau.

Grâce à ces vues pratiques, la nouvelle société saura recruter un nombre considérable de membres et rendre de grands services à la science : c'est, du moins, ce que nous lui souhaitons.

* * *

Parmi les ouvrages sur les Coléoptères parus récemment, nous

nous permettons de signaler les suivants, en les recommandant à nos abonnés :

- I. *Naturgeschichte der Insecten Deutschlands*, begonnen von Dr Erichson, fortgesetzt von Prof. Dr Schaum, Dr G. Kraatz, H. v. Kiesenwetter und Julius Weise. — Erste Abtheilung : Coleoptera. — Sechster Band, Erste Lieferung, bearbeitet von Julius Weise. — Cette partie de l'important ouvrage sur les Coléoptères d'Allemagne comprend le commencement des Chrysomélides : 1^{re} division, Eupoda ; tribus des Sagrini, Donaciini, Criocerini. — 2^e division : Camptosoma ; tribus des Clytrini et des Cryptocephalini (cette dernière tribu n'est que commencée).

Entièrement traitée sur le même plan que les volumes précédents, cette nouvelle livraison est appelée à rendre d'importants services aux coléoptéristes.

En vente, au prix de 4,50 marks, à la librairie R. Stricker (Nicolaische Verlags-Buchhandlung), Brüderstrasse, 13, Berlin.

- II. *Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der Entomologie*, während des Jahres 1880, von Dr Philipp Bertkau, in Bonn. — Les pages 194 à 256 de cet ouvrage sont consacrées aux coléoptères : après avoir cités les ouvrages généraux publiés en 1880 sur cet ordre d'insectes, l'auteur donne, par familles, la liste des espèces et genres nouveaux décrits dans la même année, avec le nom de l'auteur, l'habitat, l'indication des publications et pages où se trouvent les descriptions.

Ce volume est d'ailleurs traité sur le même plan que les précédents. En vente à la même librairie, au prix de 10 marks.

- III. *Faune des Coléoptères du bassin de la Seine*, par Louis Bedel. — 1^{re} partie : Tome I^{er}, avec planche (publié dans les Annales de la Société Entomologique de France, années 1879 à 1881.) — Ce tome comprend : Avant-propos, Abréviations et signes spéciaux, Vocabulaire, Genres et espèces décrits dans ce volume, Errata. — 1^{er} sous-ordre : Carnivora (Cicindelidæ, Carabidæ, Haliplidæ, Dyticidæ et Gyrinidæ), avec le catalogue après chaque famille. — 2^e sous-ordre : Palpicornia (Hydrophilidæ et catalogue, Sphæridiidæ et catalogue). — Supplément.

Prix : 5 francs. S'adresser à M. Lucien Buquet, trésorier de la Société Entomologique de France, 52, rue Saint-Placide, Paris.

Nous prions les coléoptéristes qui préparent un travail monographique de nous faire connaître le groupe dont ils s'occupent, pour que nous puissions l'indiquer dans la *Revue Coléoptérologique*, et engager nos abonnés et correspondants à envoyer leurs collections d'insectes de ce groupe, pour autant qu'elles soient intéressantes.

* * *

Nous insérerons volontiers les annonces de nos abonnés qui désireraient céder des collections ou parties de collections assez importantes.

* * *

Une souscription, au prix de 20 francs, est ouverte chez le Trésorier de la Société Entomologique de France (M. L. Buquet, rue Saint-Placide, 52, Paris), pour la publication de Tables générales alphabétiques et analytiques des Annales de cette Société, de 1861 à 1880. La publication de ces tables commencera dès qu'il y aura cent cinquante souscripteurs et, alors, le prix du volume sera porté à 24 francs pour les non-souscripteurs. On peut s'inscrire directement chez le Trésorier, ou adresser son adhésion par lettre.

* * *

La collection générale de Coléoptères européens et exotiques de M. Desbrochers des Loges (à Ardentes, près Châteauroux, Indre) sera vendue le lundi 20 février, à l'Hôtel des Ventes (rue Drouot), à Paris. M. Henri Deyrolle (248, Faubourg-Saint-Honoré, Paris) se chargera des commissions. Il y aura exposition le dimanche 19, veille du jour de vente.

* * *

A partir du n° 2 (mars), la « Revue Coléoptérologique » paraîtra vers le 25 de chaque mois.



REVUE COLÉOPTÉROLOGIQUE

PUBLIÉE PAR

Constant VAN DEN BRANDEN

ET PARAISSANT TOUS LES MOIS

PRIX D'ABONNEMENT : Par an : pour la Belgique, 8 francs ; pour l'étranger, 10 francs. — S'adresser, à Bruxelles, chez M. C. Van den Branden, 69, rue de la Madeleine, ou à Berlin, à la librairie R. Friedländer & Sohn, 11, Carlstrasse. — Pour tous renseignements ou communications, s'adresser à M. C. Van den Branden.

BIBLIOGRAPHIE.

Notes from the Leyden Museum. — Vol. IV, Part. I. — January 1882. — Note II : Description of a new Genus and Species of the coleopterous family Colydidæ, by E. Reitter, p. 55. — Note III : Description of a new species of the coleopterous family Staphylinidæ, by A. Fauvel, p. 58. — Note IV : New species of Gyrinidæ in the Leyden Museum, described by Dr M. Régimbart, p. 59.

Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft. — Vol. VI. Heft N° 5. — 20. Januar 1882. — Bericht über die 24. Sitzung der schweizerischen entomologischen Gesellschaft am 7. August 1881 in Aarau, p. 211. — Beschreibung einiger neuen Rüsselkäfer von Dr Stierlin, p. 250. — Correspondenz aus Bern, p. 256.

The Transactions of the Entomological Society of London for the year 1881. Part V. (Feb. 1st, 1882.) — Titres, tables, etc.; liste des membres, accroissements de la bibliothèque pendant l'année 1881; Proceedings: December 7, 1881; Annual Meeting, January 18, 1882: The President's address; Index.

The Entomologist's Monthly Magazine. — Vol. XVIII, n° 213; february 1882. — Mac Lachlan : Measurements in descriptive

Entomology; a suggestion, p. 205. — W.-G. Blatch : *Oxytelus fulvipes* in Warwickshire, p. 213. — G. Lewis : Influence of size of elytra on flight in beetles, 213. — F.-W. Savage : Capture of *Cassida vittata* near Hastings, p. 214. — G.-C. Champion : More Tropical notes, p. 214. — Obituary : Prof. C.-G.-A. Giebel; Jules Putzeys, p. 215. — North Middlesex Natural History Association; Rivista Scientifico-Industriale e Giornale del Naturalista. — Proceedings of the Entomological Society of London, p. 216.

Revista da Sociedade de Instrução do Porto. — Segundo anno, n° 2; 1 de Fevereiro de 1882. — Catalogue des insectes du Portugal, par Manuel Paulino d'Oliveira : Introduction, Catalogue des Coléoptères : Cicindelidæ, Carabidæ (Omophronini).

The Entomologist. — Vol. XV, n° 225; february 1882. — Entomological Notes, Captures, etc. : G.-A. Lewcock : *Plagiodera armoraciæ*, p. 46. — T.-L. Pennell : Description of the larva of *Lina longicollis*, p. 46. — New Natural History Society, p. 47. — Notice of Magazine : The " Union Jack Naturalist ", p. 47. — Notes from current Entomological Literature : Economic Entomology, p. 48.

Feuille des Jeunes Naturalistes. — 12^e année, n° 136, 1^{er} février 1882. — Communications : H. du Buysson : *Sitones regensteinensis*, p. 44; Du Brossay : Chasse de l'*Aëpus Robinii*, p. 44; Capitaine Xambeu : Note au sujet de l'*Onthophagus Maki*, p. 45. — Liste d'échanges; Échanges. — Bulletin bibliographique de la Feuille des Jeunes Naturalistes; ouvrages reçus.

Le Naturaliste. — 4^e année, n° 3; 1^{er} février 1882. — L. Fairmaire : Diagnoses de trois Coléoptères (*Cyrtonus*) nouveaux, p. 19. — Le *Carabus Olympiæ*, p. 19. — Offres et demandes, p. 24.

Id. — N° 4; 15 février 1882. — L. Bedel : Classification des Coléoptères carnassiers (mémoire de M. Horn sur les genres de *Carabidæ*), p. 29. — Chronique et nouvelles, p. 31. — Livres nouveaux, p. 32.

The American Naturalist. — Vol. XVI, N° 2; February 1882. — Recent Literature : Miss Ormerod's Manual of Injurious Insects, p. 129. — General Notes, Entomology : New Insects Injurious to Agriculture, p. 151. — New Entomological Periodicals, p. 152.

Il Naturalista Siciliano. — Anno I, N. 5; 1 Febbraio 1882. — E. Abeille de Perrin : Supplément à la monographie des Malachides d'Europe et des pays voisins, p. 110. — F. Baudi : Note Entomologiche (continua), p. 115.

Mémoires de la Société Royale des Sciences de Liège; 2^e série, t. IX, 20 février 1882. — E. Candèze : *Élatérides* nouveaux,

3^e fascicule. — A. Preudhomme de Borre : Matériaux pour la faune entomologique de la province de Liège. Coléoptères, 1^{re} centurie. Id., 2^e centurie.

L'année scientifique et industrielle, par L. Figuier. — 25^e année (1881). — Paris, 1882. — Agriculture : Les ennemis naturels du Phylloxera, p. 385. — Le charançon du pommier, p. 387. — Les insectes destructeurs des pins de la Sologne, p. 388. — Le Doryphora en Belgique, p. 391.

Entomologisk Tidskrift, 1881, Arg. 2, Häft. 4; Stockholm, 1882. — O.-Th. Sandahl : Smärre meddelanden (espèces rares ou nouvelles pour la Suède), p. 209. — Résumés, p. 219.

Nouvelles et faits divers de l'Abeille, 2^e série. — N^o 38, 1882. — Note à propos de vieux noms ressuscités par M. de Heyden, p. 150.

Id. — N^o 39, 1882. — Premiers états des Mylabres, p. 154. — Lettre adressée à M. de Marseul par M. George Lewis, à Ceylan, p. 155.

Société Entomologique de France. — Bulletin des séances : Séance du 8 février 1882. — Ch. Brisout de Barneville : Remarques, synonymies et descriptions de quelques espèces de Cryptophagiens et de Nitidulaires, p. 30. — L. Fairmaire : Description d'une troisième espèce du genre *Aprostoma* (Colydiens), p. 33. — D^r Sénac : Diagnoses de trois nouvelles espèces du genre *Pimelia*, p. 33. — L. von Heyden : Note synonymique, p. 34.

Id. — Séance du 22 février 1882. — Des Gozis : Réponse aux observations synonymiques de M. von Heyden, insérées dans le 2^e Bulletin de 1882, p. 42.

Société Entomologique de Belgique : Comptes-rendus des séances; Série III, N^o 15; Assemblée mensuelle du 4 février 1882. — van Lansberge : Énumération des Scarabæides rapportés du pays des Somalis (Afrique équatoriale) par M. Révoil, avec diagnoses des espèces nouvelles, p. xxi. — A. Chevrolat : Description de nouveaux Cholidés, p. xxxi. — A. Pr. de Borre : Variétés nouvelles de Coléoptères indigènes, p. xxxiii.

Deutsche Entomologische Zeitschrift. — XXVI, 1882, Heft I, ausgeg. Februar 1882. — D^r G. Kraatz : Revision der europäisch-syrischen Arten der Melolonthiden-Gattung *Haplidia* Hope, p. 33. — D^r L. von Heyden : Beitrag zur Coleopteren-Fauna der Sierra de Cordoba, p. 43. — D^r G. Kraatz : Ueber die Gattung *Clinteria* Burm., p. 49. — D^r G. Kraatz : Ist der Prosternal fortsatz von *Goliathus Higginsi* Westw. ♀ von allen übrigen Goliathen auffalend abweichend?, p. 51. — D^r G. Kraatz : Ueber-sicht der europäischen *Tropiphorus*-Arten nach D^r Stierlin's Arbeit, p. 53. — J. Weise : Ueber *Cyaniris thoracica* Küster,

p. 56. — D^r G. Kraatz : Revision der Arten der Dynastiden-Gattung *Pentodon* Hoppe, p. 57. — D^r G. Kraatz : Die africanischen *Leucoceliden* und die ihnen zunächst verwandten Gattungen der *Cetoniden*, p. 65. — D^r G. Kraatz : Ueber die Verwandten der *Leucocelis hæmorrhoidalis* Fabr., p. 79. — D^r G. Kraatz : Beiträge zur Käferfauna von Turkestan. II. Neue *Tenebrioniden* von Margelan, p. 81. — D^r G. Kraatz : Zwei neue *Melyriden*-Gattungen von Margelan, p. 96. — L. von Heyden und G. Kraatz : Käfer um Margelan, gesammelt von Haberhauer, p. 99. — D^r G. Kraatz : Ueber einige Fischer'sche *Tenebrioniden*-Typen des Dresdener zoologischen Museums, p. 119. — Edm. Reitter : Ueber die verschiedenen Forceps-Bildungen der europäischen *Cistela*-(*Byrrhus*-) Arten, p. 121, pl. I. — Forceps-Abbildungen von exotischen *Melolonthiden* nach Präparaten von Metzler in Frankfurt a/M., p. 123, pl. II et III. — D^r G. Kraatz : Ist *Carabus punctato-auratus* wirklich *auronitens* var.?, p. 125. — v. Heyden, Wilcken, Kraatz : Für Deutschland neue Käfer, p. 128. — Edm. Reitter : Neue *Pselaphiden* und *Scydmaeniden* aus Brasilien, p. 129, pl. V. — D^r L. v. Heyden : Fünfzig Ergänzungen und Bemerkungen zum Catalogus Coleopterorum Europæ, p. 153. — D^r L. v. Heyden : Neue und seltene *Elateriden* aus der Krimm, p. 155. — G. Kraatz und J. Weise : Synonymische Bemerkungen, p. 156. — *Magdalis Weisei* Schreiner, neue deutsche Art, p. 159. — *Neuere Literatur*, p. 161 : Histoire Naturelle des Coléoptères de France, Lathridiens, par J. Belon; G. Horn's Revision of the Nitidulidæ of the United States; G. Horn, Synopsis of the Monotomidæ of the United States (analysés par E. Reitter). Die Käfer Westfalens zusammengestellt von Fr. Westhoff, I Abtheilung (G. Kraatz). Neue entomologische oder theilweise entomologische Zeitschriften und Publicationen (G. Kraatz). — G. Kraatz : Die Auflösung des Münchener Entomolog. Vereins; Deutsche Entomologische Zeitschrift, 1882, Heft II; Catalog der Coleopteren von Sibirien von L. v. Heyden, p. 175. — Edm. Reitter : Beitrag zur Kenntniss der *Pselaphiden* und *Scydmaeniden* von Westafrika, p. 177.

Gyrinides nouveaux de la collection du Musée civique de Gênes, par M. Régimbart. 1 broch. in-8°, 5 p. — (Extrait des " Ann. del Mus. civ. di St. nat. di Genova, " vol. XVIII) — 20 febbraio 1882.

Nunquam Otiosus, Band III, p. 513-528 ausgegeben am 15. Januar 1882. — L. W. Schaufuss : *Carabus Nordmanni* und Verwandte desselben, monographisch bearbeitet, p. 513. — L. W. Schaufuss : Zoologische Ergebnisse von Excursionen auf den Balearen. III (Addenda und Fortsetzung), p. 527.



ESPÈCES NOUVELLES.

- 36*. *MUNARIA* (n. g.) Reitter, Notes f. Leyd. Mus., IV,
Jan. 1882, Note II, p. 55 (fam. Colydidæ. — Genres
voisins : Mecedanops et Colydium).
M. Ritsemæ Rtrr., l. c., p. 56. Sumatra.
37. *Osorius cordicollis* Fauvel, Notes Leyd. Mus., IV,
Jan. 1882, Note III, p. 58. —
38. *Enhydrus Sumbawæ* Régimbart, Notes Leyd.
Mus., IV, Jan. 1882, Note IV, p. 59. Sumbawa.
39. — *cenescens* Régimb., l. c., p. 60. Timor.
40. *Dineutes Regimbarti* (Ritsema in litt.) Régimb.,
l. c., p. 61. —
41. — *Ritsemæ* Régimb., l. c., p. 62. Célèbes (Nord).
42. *Orectochilus validus* Régimb., l. c., p. 63. —
43. — *conspicuus* Régimb., l. c., p. 64. Ceylan.
44. — *bipartitus* Régimb., l. c., p. 65. Java.
45. — *lucidus* Régimb., l. c., p. 66. —
46. — *Ritsemæ* Régimb., l. c., p. 67. —
47. — *suturalis* Régimb., l. c., p. 68. Natal.
48. *Gyretes scaphidiformis* Régimb., l. c., p. 69. Bogota.
49. — *glabratus* Régimb., l. c., p. 70. Brésil.
50. — *pygmeus* Régimb., l. c., p. 70. —
51. *Otiiorhynchus Dobrutschæ* Stierlin, Mitt. Schweiz.
entom. Ges., VI, 5, Jan. 1882,
p. 250. Turquie.
52. — *parvulus* Stierlin, l. c., p. 251. —
53. *Erirhinus Merkli* Stierlin, l. c., p. 252. Hongrie mérid.
54. *Cionus Merkli* Stierlin, l. c., p. 253. Turquie.
55. *Trachodes Heydeni* Stierlin, l. c., p. 254. Croatie.
56. *Meira Grouwellei* Stierlin, l. c., p. 255. France mérid.
57. *Cyrtonus contractus* Fairmaire, Naturaliste, 1^{er} fé-
vrier 1882, p. 19. Sierra Nevada.
58. — *puncticeps* Fairm., l. c., p. 19. Espagne.
59. — *comorphus* Fairm., l. c., p. 19. Pajarès.
60. *Malachius flammeus* Abeille de Perrin, Il Natur.
Sicil., I, N. 5, 1 Febbraio 1882,
p. 110. Syrie.
61. — *opacipennis* Abeille de P., l. c., p. 111. —

* Dans le n° 1 de la *Revue Coléoptérologique*, deux espèces portent le n° 6 ; la liste du premier numéro comprend donc 35 espèces nouvelles et non 34. Dans le numérotage, les variétés ne seront pas comptées.

62. *Malachius Limbicollis* Abeille de P., l. c., p. 112. Espagne.
 63. — *Heydeni* Abeille de P., l. c., p. 113. ?
 64. — *falcifer* Abeille de P., l. c., p. 114. Caucase; Hongr.
 65. — (*Chionotopus*) *6-plagiatus* Abeille de P., l. c., p. 115. Syrie.
 66. *Anophtalmus siculus* Baudi, Il Nat. Sicil., I, N. 5, 1882, p. 116. Sicile.
 67. *Agrypnus soricinus* Candèze, Elatér. nouv., 3^e fasc. (Mém. Soc. Sc. Liège, 2^e S., IX), p. 1. Nouvelle-Guinée.
 68. — *pacificus* Cand., l. c., p. 1. Woodlark.
 69. *Adelocera altaïca* Cand., l. c., p. 2. Altaï.
 70. — *massula* Cand., l. c., p. 2. Mexique.
 71. *Dilobitarsus filiformis* Cand., l. c., p. 3. Abyssinie.
 72. — *bacillus* Cand., l. c., p. 3. —
 73. *Anacantha Fairmairei* Cand., l. c., p. 3. Chili.
 74. ANASPASIS (n. g.) Cand., l. c., p. 4 (genre de la tribu des Agrypnites, pouvant prendre rang non loin des *Anacantha*).
 A. fasciolata Cand., l. c., p. 5. Chili; Patagonie.
 75. *Lacon decoratus* Cand., l. c., p. 6. Madagascar.
 76. — *subocellatus* Cand., l. c., p. 6. Nossi-Bé.
 77. — *signatus* Cand., l. c., p. 6. Zanguebar.
 78. — *æthiopicus* Cand., l. c., p. 7. Abyssinie.
 79. — *caffer* Cand., l. c., p. 7. Caffrerie.
 80. — *colonicus* Cand., l. c., p. 8. Cochinchine.
 81. — *setulosus* Cand., l. c., p. 8. Sumbawa.
 82. — *spretus* Cand., l. c., p. 8. Bornéo.
 83. — *Delesserti* Cand., l. c., p. 9. Neelgherrhies.
 84. — *pardalinus* Cand., l. c., p. 9. Darjeeling.
 85. — *limosus* Cand., l. c., p. 10. Nouvelle-Guinée.
 86. — *gibbus* Cand., l. c., p. 10. Australie septentrionale.
 87. — *compactus* Cand., l. c., p. 10. —
 88. — *rubiginosus* Cand., l. c., p. 11. —
 89. — *Mac Leayi* Cand., l. c., p. 11. Australie.
 90. — *Castelnani* Cand., l. c., p. 11. —
 91. — *corvinus* Cand., l. c., p. 12. —
 92. — *monachus* Cand., l. c., p. 12. Victoria.
 93. — *palpalis* Cand., l. c., p. 13. Australie septentrionale.
 94. — *dealbatus* Cand., l. c., p. 13. Cap-York.
 95. *Tilotarsus suboculatus* Cand., l. c., p. 13. Antananarivo.
 96. — *depressus* Cand., l. c., p. 14. Madagascar.
 97. — *reductus* Cand., l. c., p. 14. Gabon.
 98. *Alaus Dohrni* Cand., l. c., p. 15. Monrovia.

- | | | |
|------|---|---------------------|
| 99. | <i>Alaus Crokisii</i> Cand., l. c., p. 15. | Grand-Bassam. |
| 100. | — <i>Hacquardi</i> Cand., l. c., p. 15. | Zanguebar. |
| 101. | — <i>pantherinus</i> Cand., l. c., p. 16. | Mindanao. |
| 102. | — <i>Laportei</i> Cand., l. c., p. 17. | Malacca. |
| 103. | — <i>Cölffi</i> Cand., l. c., p. 17. | Sumbawa. |
| 104. | — <i>Hurria</i> Cand., l. c., p. 17. | Sumatra. |
| 105. | — <i>Acontias</i> Cand., l. c., p. 18. | Nouvelle-Guinée. |
| 106. | — <i>Oreas</i> Cand., l. c., p. 19. | Célèbes. |
| 107. | — <i>Lansbergei</i> Cand., l. c., p. 19. | Java oriental. |
| 108. | — <i>griseus</i> Cand., l. c., p. 20. | Nouvelle-Grenade. |
| 109. | <i>Hemirhipus elegantissimus</i> Cand., l. c., p. 20. | La Plata. |
| 110. | <i>Chalcolepidius Mniszechi</i> Cand., l. c., p. 21. | Mexique. |
| 111. | — <i>cyaneus</i> Cand., l. c., p. 21. | Brésil. |
| 112. | — <i>Humboldti</i> Cand., l. c., p. 22. | Bogota. |
| 113. | <i>Semiotus splendidus</i> Cand., l. c., p. 23. | Equateur. |
| 114. | <i>Campsosternus Lansbergei</i> Cand., l. c., p. 23. | Java oriental. |
| 115. | — <i>taeniatus</i> Cand., l. c., p. 24. | Java. |
| 116. | — <i>carinatus</i> Cand., l. c., p. 24. | Bornéo. |
| 117. | <i>Pectocera malaïsiانا</i> Cand., l. c., p. 24. | Célèbes. |
| 118. | <i>Tetralobus Livingstonei</i> Cand., l. c., p. 25. | Zambèze. |
| 119. | — <i>rubiginosus</i> Cand., l. c., p. 25. | Monrovia. |
| 120. | — <i>Raffrayi</i> Cand., l. c., p. 26. | Abyssinie. |
| 121. | — <i>Dohrni</i> Cand., l. c., p. 26. | Guinée. |
| 122. | — <i>capucinus</i> Cand., l. c., p. 27. | Australie septentr. |
| 123. | <i>Pantolamprus Dohrni</i> Cand., l. c., p. 27. | Monrovia. |
| 124. | <i>Psephus guineensis</i> Cand., l. c., p. 27. | Guinée septentrion. |
| 125. | — <i>Oberthüri</i> Cand., l. c., p. 28. | Zanguebar. |
| 126. | — <i>militaris</i> Cand., l. c., p. 28. | — |
| 127. | — <i>nigricornis</i> Cand., l. c., p. 29. | — |
| 128. | — <i>Mechowi</i> Cand., l. c., p. 29. | Congo. |
| 129. | — <i>melancholicus</i> Cand., l. c., p. 29. | Cafrerie. |
| 130. | — <i>Raffrayi</i> Cand., l. c., p. 30. | Zanguebar. |
| 131. | — <i>morio</i> Cand., l. c., p. 30. | Monrovia. |
| 132. | — <i>athoides</i> Cand., l. c., p. 31. | Angola. |
| 133. | — <i>tabidus</i> Cand., l. c., p. 31. | Cafrerie. |
| 134. | — <i>correctus</i> Cand., l. c., p. 32. | Gabon. |
| 135. | — <i>juvenilis</i> Cand., l. c., p. 32. | — |
| 136. | — <i>minor</i> Cand., l. c., p. 33. | — |
| 137. | — <i>Murrayi</i> Cand., l. c., p. 33. | Calabar. |
| 138. | — <i>nitidus</i> Cand., l. c., p. 33. | — |
| 139. | — <i>dentatus</i> Cand., l. c., p. 34. | Gabon. |
| 140. | — <i>sanguinolentus</i> Cand., l. c., p. 34. | — |
| 141. | — <i>nobilis</i> Cand., l. c., p. 35. | Ceylan. |
| 142. | — <i>rufinus</i> Cand., l. c., p. 35. | — |

143. *Psephus papuensis* Cand., l. c., p. 35. Nouvelle-Guinée.
 144. — *lateralis* Cand., l. c., p. 36. Sumbava.
 145. — *subfuscus* Cand., l. c., p. 36. Ternate.
 146. *Dicronychus Hacquardi* Cand., l. c., p. 36. Zanguebar.
 147. — *psephoides* Cand., l. c., p. 37. Delogo-Bay.
 148. — *granulatus* Cand., l. c., p. 37. Cafreterie.
 149. — *mandibularis* Cand., l. c., p. 37. —
 150. — *tritus* Cand., l. c., p. 38. Transvaal.
 151. TARSALGUS (n. g.) Cand., l. c., p. 39 (genre de la tribu des Dicrèpidiites, à placer à la suite des *Dicronychus*).
 T. Mechowi Cand., l. c., p. 39. Congo.
 152. *Anoplischius egaensis* Cand., l. c., p. 40. Amazones.
 153. — *rusticus* Cand., l. c., p. 40. Brésil.
 154. — *suturalis* Cand., l. c., p. 40. —
 155. — *elegantulus* Cand., l. c., p. 41. Bogota.
 156. — *coloides* Cand., l. c., p. 41. Colombie.
 157. — *melanotoïdes* Cand., l. c., p. 41. Brésil.
 158. *Ischiodontus hawaiensis* Cand., l. c., p. 42. Iles Sandwich.
 159. — *decoratus* Cand., l. c., p. 42. Brésil.
 160. *Spilus brevis* Cand., l. c., p. 43. Régions de l'Amazone.
 161. *Dicrepidius cavifrons* Cand., l. c., p. 43. Guadeloupe.
 162. *Eudactylus bivofeatus* Cand., l. c., p. 43. Antilles.
 163. *Glypheus Lansbergei* Cand., l. c., p. 44. Victoria.
 164. *Simodactylus tertius* Cand., l. c., p. 44. Nouvelle-Guinée.
 165. *Melanthoides luteipes* Cand., l. c., p. 45. Zanguebar.
 166. *Glyphochilus Championi* Cand., l. c., p. 45. Australie.
 167. — *occidentalis* Cand., l. c., p. 45. —
 168. APOCHRYSIS (n. g.) Cand., l. c., p. 46 (genre de la tribu des Monocrèpidiites, à classer tout auprès des *Dorygonus*).
 A. asper Cand., l. c., p. 46. Benguela.
 169. *Monocrepidius alacer* Cand., l. c., p. 47. Brésil.
 170. — *Rodriguezi* Cand., l. c., p. 47. Guatemala.
 171. — *fossulatus* Cand., l. c., p. 48. Brésil.
 172. — *vulneratus* Cand., l. c., p. 48. Mexique.
 173. — *lenis* Cand., l. c., p. 48. Régions de l'Amazone.
 174. — *calcaratus* Cand., l. c., p. 49. Brésil.
 175. — *concretus* Cand., l. c., p. 50. Cayenne.
 176. — *figularis* Cand., l. c., p. 50. Saint-Domingue.
 177. — *probus* Cand., l. c., p. 50. Guatemala.
 178. — *monachus* Cand., l. c., p. 51. Bangkok.
 179. — *capucinus* Cand., l. c., p. 51. Cochinchine.
 180. — *antennalis* Cand., l. c., p. 52. Australie occid.

181. *Monocrepidius aurulentus* Cand., l. c., p. 52. Australie.
 182. — *plagiatus* Cand., l. c., p. 52. —
 183. — *spatulatus* Cand., l. c., p. 53. —
 184. — *amazonicus* Cand., l. c., p. 53. Régions de l'Amazone.
 185. *Æolus Waggae* Cand., l. c., p. 54. Nouv.-Galles du Sud.
 186. — *versicolor* Cand., l. c., p. 54. Australie occid.
 187. — *Steinheili* Cand., l. c., p. 54. Bogota.
 188. — *livens* Cand., l. c., p. 55. Amazones.
 189. — *pectoralis* Cand., l. c., p. 55. Venezuela.
 190. — *unicolor* Cand., l. c., p. 56. Amazones.
 191. *Heteroderes æoloïdes* Cand., l. c., p. 56. Gabon.
 192. — *crux* Cand., l. c., p. 56. Abyssinie.
 193. — *juvencus* Cand., l. c., p. 57. —
 194. — *cryptohypnoïdes* Cand., l. c., p. 57. Perse.
 195. — *Arechavaletæ* Cand., l. c., p. 58. Montevideo.
 196. *Physorhinus insularis* Cand., l. c., p. 58. Guadeloupe.
 197. *Anchastus fasciatus* Cand., l. c., p. 58. Amazones.
 198. — *bicolor* Cand., l. c., p. 59. —
 199. — *militaris* Cand., l. c., p. 59. Californie.
 200. — *brevis* Cand., l. c., p. 59. Bogota.
 201. — *Raffrayi* Cand., l. c., p. 60. Abyssinie.
 202. — *Klugi* Cand., l. c., p. 60. Afrique équator.
 203. — *ligneus* Cand., l. c., p. 61. Gabon.
 204. — *pectoralis* Cand., l. c., p. 61. —
 205. — *unicolor* Cand., l. c., p. 61. Mindanao.
 206. *Drasterius æthiopicus* Cand., l. c., p. 62. Abyssinie.
 207. — *brevipennis* Cand., l. c., p. 62. —
 208. *Elater violacæpennis* Cand., l. c., p. 62. Californie.
 209. — *Horni* Cand., l. c., p. 63. —
 210. — *partitus* Cand., l. c., p. 63. —
 211. — *asperulus* Cand., l. c., p. 64. Australie.
 212. *Elastrus senegalensis* Cand., l. c., p. 64. Sénégal.
 213. *Megapenthes Reedi* Cand., l. c., p. 64. Chili.
 214. — *funnebris* Cand., l. c., p. 65. Chine centr.
 215. — *longus* Cand., l. c., p. 65. Siam.
 216. — *jocosus* Cand., l. c., p. 65. Malacca.
 217. — *sondanicus* Cand., l. c., p. 66. Java.
 218. — *octoguttatus* Cand., l. c., p. 66. Chine centr.
 219. — *brasilianus* Cand., l. c., p. 66. Brésil.
 220. *Melanoxanthus ducalis* Cand., l. c., p. 67. Célèbes.
 221. — *Lansbergei* Cand., l. c., p. 67. Sumatra.
 222. — *florensis* Cand., l. c., p. 68. Flores.
 223. — *filiiformis* Cand., l. c., p. 68. Célèbes.

224. *Melanoxanthus ardjoenicus* Cand., l. c., p. 68. Java.
 225. — *nigritulus* Cand., l. c., p. 69. —
 226. — *inæqualis* Cand., l. c., p. 69. Gabon.
 227. — *dilatocollis* Cand., l. c., p. 69. Queensland.
 228. — *cuneiformis* Cand., l. c., p. 69. Australie.
 229. HOMOTECHNES (n. g.) Cand., l. c., p. 71 (genre de la tribu des Elatérites, à placer à côté du genre *Ypsilostethus*).
 H. corymbitoïdes Cand., l. c., p. 71. Chine centr.
 230. *Deromecus carinatus* Cand., l. c., p. 72. Chili.
 231. — *tumidus* Cand., l. c., p. 72. —
 232. — *tenuicollis* Cand., l. c., p. 72. —
 233. — *anchastinus* Cand., l. c., p. 73. —
 234. — *cervinus* Cand., l. c., p. 73. —
 235. *Betarmon anatolicus* Cand., l. c., p. 74. Smyrne.
 236. — *Sharpi* Cand., l. c., p. 74. Nouvelle-Zélande.
 237. *Smilicerus zonatus* Cand., l. c., p. 74. Bogota.
 238. *Cryptohypnus davidianus* Cand., l. c., p. 75. Chine centr.
 239. — *Oberthüri* Cand., l. c., p. 75. Nouv.-Grenade.
 240. — *atomarius* Cand., l. c., p. 76. Himalaya.
 241. — *æqualis* Cand., l. c., p. 76. Uruguay.
 242. PSEUDICONUS (n. g.) Cand., l. c., p. 76 (genre de la tribu des Cryptohypnites, où il constitue une forme intermédiaire entre cette tribu et celle des Athoïtes).
 P. mendax Cand., l. c., p. 77. Chili.
 243. *Cardiophorus microcephalus* Cand., l. c., p. 77. Maroc.
 244. — *inflatus* Cand., l. c., p. 78. Mandchourie.
 245. — *erythrurus* Cand., l. c., p. 78. Chine centr.
 246. — *angularis* Cand., l. c., p. 79. Zanzibar.
 247. — *jocosus* Cand., l. c., p. 79. Abyssinie.
 248. — *folliculus* Cand., l. c., p. 79. Zanzibar.
 249. — *gagatinus* Cand., l. c., p. 80. Abyssinie.
 250. — *rudis* Cand., l. c., p. 80. Nubie.
 251. — *davidianus* Cand., l. c., p. 80. Chine centr.
 252. — *devius* Cand., l. c., p. 81. —
 253. — *acuminatus* Cand., l. c., p. 81. Cafrerie.
 254. — *Burdoi* Cand., l. c., p. 82. Usagara.
 255. — *Usagaræ* Cand., l. c., p. 82. —
 256. — *ligneus* Cand., l. c., p. 82. Madagascar.
 257. — *compactus* Cand., l. c., p. 83. Australie.
 258. — *despectus* Cand., l. c., p. 83. —
 259. *Horistonotus basilaris* Cand., l. c., p. 84. Para.
 260. — *rufiventris* Cand., l. c., p. 84. Guatemala

261. *Horistonotus pedestris* Cand., l. c., p. 84. Guatemala.
 262. — *Arechavaletæ* Cand., l. c., p. 85. Uruguay.
 263. — *minimus* Cand., l. c., p. 85. Brésil.
 264. *Esthesopus apicatus* Cand., l. c., p. 85. Mexique.
 265. — *bellus* Cand., l. c., p. 85. Amazones.
 266. *Diploconus nigripennis* Cand., l. c., p. 86. Sumatra.
 267. — *umbilicatus* Cand., l. c., p. 86. Java oriental.
 268. — *barbus* Cand., l. c., p. 87. Célèbes.
 269. *Melanotus Desbrochersi* Cand., l. c., p. 87. Açores.
 270. — *incallidus* Cand., l. c., p. 88. Assam.
 271. — *brevis* Cand., l. c., p. 88. Cochinchine.
 272. — *carbonarius* Cand., l. c., p. 88. Chine.
 273. — *sciurus* Cand., l. c., p. 89. —
 274. — *nuceus* Cand., l. c., p. 89. Chine centr.
 275. — *arctus* Cand., l. c., p. 89. —
 276. *Athous jocosus* Cand., l. c., p. 90. Amur.
 277. *Pyrophorus scintillula* Cand., l. c., p. 91. Para.
 278. — *trinotatus* Cand., l. c., p. 91. Brésil.
 279. — *notatissimus* Cand., l. c., p. 92. Surinam.
 280. PARAPHILEUS (n. g.) Cand., l. c., p. 92 (à placer
 tout à fait à côté des Pyrophorus).
P. Thoreyi Germar, Entom. Zeitsch., V, p. 188
 (Aphanobius); Cand., l. c., p. 93 ⁽¹⁾. Brésil.
 281. HIFO (n. g.) Cand., l. c., p. 94 (tribu des Pyropho-
 rites).
H. pacificus Cand., l. c., p. 94. Tonga-Tabou.
 282. *Corymbites Le Contei* Cand., l. c., p. 94. Californie.
 283. — *morosus* Cand., l. c., p. 95. Cochinchine.
 284. — *litura* Cand., l. c., p. 95. Australie.
 285. — *ambiguus* Cand., l. c., p. 96. —
 286. — *centralis* Cand., l. c., p. 96. Chine centr.
 287. — *sulcatus* Cand., l. c., p. 96. Silésie.
 288. — *elegans* Cand., l. c., p. 97. Californie.
 289. *Chrosis Lansbergei* Cand., l. c., p. 97. Nouv.-Galles du Sud.
 290. *Hapatesus hirtellus* Cand., l. c., p. 98. Nouvelle-Guinée.
 291. DIADYSIS (n. g.) Cand., l. c., p. 98 (à placer dans
 les Corymbitites, non loin des Chrosis, Mela-
 nactes, etc.).
D. Morsi Cand., l. c., p. 99. Cap York.
 292. OSORNO (n. g.) Cand., l. c., p. 100 (genre devant
 peut-être constituer une nouvelle tribu, mais
 placé provisoirement à la suite des Corymbitites).
O. ambiguus Cand., l. c., p. 100. Patagonie.

(¹) Insecte non noté dans le catalogue de Munich.

293. PARASAPHES (n. g.) Cand., l. c., p. 101 (tribu des
Asaphites).
P. elegans Cand., l. c., p. 101. Australie.
294. *Cardiorhinus lætipennis* Cand., l. c., p. 102. Brésil.
295. — — *tactus* Cand., l. c., p. 102. Amazones.
296. *Ludius Schaumi* Cand., l. c., p. 103. Grèce.
297. — *sinensis* Cand., l. c., p. 103. Chine.
298. — *sihleticus* Cand., l. c., p. 103. Sihlet.
299. — *anchastinus* Cand., l. c., p. 104. Moupin.
300. — *hydropicus* Cand., l. c., p. 104. Australie.
301. *Agonischius militaris* Cand., l. c., p. 104. Andamans.
302. — *longicornis* Cand., l. c., p. 105. Australie.
303. *Ochosternus gigas* Cand., l. c., p. 105. Nouvelle-Calédonie.
304. *Hemiops acutangulata* Cand., l. c., p. 105. Poulo-Pinang.
305. — *sinensis* Cand., l. c., p. 106. Chine.
306. — *longa* Cand., l. c., p. 106. Sumatra.
307. ADOLESCHEs (n. g.) Cand., l. c., p. 107 (à placer
dans le voisinage des Hemiops).
A. crinitus Cand., l. c., p. 108. Uruguay.
308. *Glyphonyx antiquus* Cand., l. c., p. 108. Nouvelle-Grenade.
309. *Cryptophagus Perrisi* (Pandellé) Ch. Brisout,
Bull. Soc. Ent. France, 8 février
1882, p. 31. France mérid.
310. — *lamellicornis* (Pandellé) Ch. Bris.,
l. c., p. 31. Pyrénées.
311. *Atomaria grandicollis* Ch. Bris., l. c., p. 31. France.
312. *Cænoscelis subdeplanata* Ch. Bris., l. c., p. 32. —
313. *Meligethes Buyssoni* Ch. Bris., l. c., p. 32. —
314. *Aprostoma Auberti* Fairmaire, Bull. Soc. Ent.
France, 8 février 1882, p. 33. Gabon.
315. *Pimelia cristata* Sénac, Id. Id., p. 33. Kurdistan.
316. — *Doumeti* Sénac, l. c., p. 33. Tunisie.
317. — *inexpectata* Sénac, l. c., p. 34. Ind. or.
318. *Scarabæus nitidicollis* v. Lansberge, Bull. Soc.
Ent. Belg., 4 fév. 1882, p. XXI.
Pays des Somalis.
319. *Gymnopleurus Somaliensis* Lansb., l. c., p. XXII. —
320. *Anachalcos obscurus* Lansb., l. c., p. XXII. —
321. *Catharsius minutus* Lansb., l. c., p. XXII. —
322. *Onthophagus Revoiti* Lansb., l. c., p. XXII. —
323. — *Æsopus* Lansb., l. c., p. XXIII. —
324. — *biarcuatus* Lansb., l. c., p. XXIII. —
325. *Hybosorus nitidus* Lansb., l. c., p. XXIII. —
326. *Trochalus margaritaceus* Lansb., l. c., p. XXIII. —

327. *Pegylis? maculipennis* Lansb., l. c., p. xxiv. Pays des Somalis.
328. *Anomala similis* Lansb., l. c., p. xxiv. —
329. *Elaphinis quadripunctata* Lansb., l. c., p. xxiv. —
330. *Gametis bipunctata* Lansb., l. c., p. xxv. —
331. — *angustata* Lansb., l. c., p. xxv. —
332. *Stalagmosoma luctuosa* Lansb., l. c., p. xxv. —
333. SOMALIBIA (g. n.), Lansb., l. c., p. xxvi (genre
voisin des Phoxomela).
- S. guttifera* Lansb., l. c., p. xxvi. —
334. *Leucocelis ruficauda* Lansb., l. c., p. xxvi. —
335. — *alboguttata* Lansb., l. c., p. xxvii. —
336. — *lacrymans* Lansb., l. c., p. xxvii. —
337. — *rufocincta* Lansb., l. c., p. xxvii. —
338. — *viridissima* Lansb., l. c., p. xxviii. —
339. — *cinctipennis* Lansb., l. c., p. xxviii. —
340. — *coerulescens* Lansb., l. c., p. xxviii. —
341. MAUSOLEOPSIS (n. g.) Lansb., l. c., p. xxix (genre
établi aux dépens d'un groupe de Leucocelis).
- Mausoleopsis albomarginata* Lansb., l. c., p. xxix. —
342. — *funebri* Lansb., l. c., p. xxx. —
343. — *oculata* Lansb., l. c., p. xxx. —
344. — *Revoili* Lansb., l. c., p. xxxi. —
345. *Cholus Philoctetes* Chevrolat, Bull. Soc. Ent.
Belg., 4 fév. 1882, p. xxxi. Colombie.
346. — *repetitus* Chevr., l. c., p. xxxii. Nouv.-Grenade.
347. — *Lebasii* Chevr., l. c., p. xxxii. —
348. — *patruelis* Chevr., l. c., p. xxxii. Para.
349. — *levipes* Chevr., l. c., p. xxxii. Cayenne.
350. *Cholus? longirostris* Chevr., l. c., p. xxxiii. Brésil.
- *Badister unipustulatus* var. *teutonoides* Pr. de
 Borre, Bull. Soc. Ent. Belg., 4 fév. 1882, p. xxxiii. Belgique.
351. *Haplidia etrusca* Kraatz, Deutsche Ent. Zeits.,
1882, I, p. 34. Étrurie.
352. — *græca* Kraatz, l. c., p. 35. Grèce.
353. — *turcica* Kraatz, l. c., p. 36. Turquie.
354. — *vagapunctata* (v. Heyden in litt.) Kraatz,
l. c., p. 36. —
355. — *tarsensis* Kraatz, l. c., p. 37. Asie Mineure.
356. — *chaifensis* Kraatz, l. c., p. 38. Syrie.
357. — *Baudii* Kraatz, l. c., p. 38. Chypre.
358. — *villosicollis* Kraatz, l. c., p. 39. Syrie.
359. — *pubiventris* Kraatz, l. c., p. 40. Anatolie.
360. — *ægyptiaca* Kraatz., l. c., p. 40. Égypte.
361. — *nitidula* Kraatz, l. c., p. 40. Syrie.

- *Haplidia cypria* Kraatz, l. c., p. 41. Chypre.
 = *H. villigera* Baudi, Deutsche Ent. Z., 1870,
 p. 74. —
362. *Leptusa Heydeni* Eppelsheim, Deutsche Ent. Z.,
 1882, I, p. 44. Andalousie.
363. *Colon rufipes* Czwalina, Id. Id., p. 45. —
364. *Silesis Cordubensis* v. Heyden, Id. Id., p. 45. —
365. *Helops Ehlersi* Kraatz, Id. Id., p. 47. —
366. *Tomoderus Ehlersi* v. Heyden, Id. Id., p. 47. —
367. *Orestia Sierrana* v. Heyd., l. c., p. 48. —
- PSEUDOCLINTERIA (n. g.) Kraatz, Deutsche Ent. Z.,
 1882, I, p. 50 (genre créé pour les *Clinteria infus-*
cata Gory et Perch., *permutans* Burm., *cincti-*
collis Burm. et *cariosa* Janson).
- AMAZULA (n. g.) Kraatz, l. c., p. 51 (genre fondé
 sur la *Clinteria suavis* Burm. = *tricolorata*
 Westw., 1874).
368. *Pentodon Balearicus* Kraatz, l. c., p. 60. Iles Baléares.
369. — *pygidialis* Kraatz, l. c., p. 61. Algérie.
370. — *Syriacus* Kraatz, l. c., p. 62. Syrie.
- STALAGMOPYGUS (n. g.) Kraatz, l. c., p. 66 (genre
 créé pour *Stalagmosoma albella* Pall.).
371. PSACADOPTERA (n. g.) Kraatz, l. c., p. 67. (genre
 fondé sur la *Pachnoda leucomelæna* Gory et
 une espèce nouvelle).
- P. simulatrix* Kraatz, l. c., p. 68. Zanzibar.
- POLYSTALACTICA (n. g.) Kraatz, l. c., p. 69 (genre
 créé pour les *Tephrea punctulata* Fabr. et *stel-*
lata Harold).
- PSEUDOTEPHREÆ (n. g.) Kraatz, l. c., p. 70 (spec.
 typ.: *Pseud. ancilla* Harold et *furfurosa* Burm.)
372. PSEUDOPROTÆTIA (n. g.) Kraatz, l. c., p. 70 (genre
 fondé sur la *Protætia stolata* Oliv. et une espèce
 nouvelle).
- P. stictica* Kraatz, l. c., p. 71. Natal.
373. LEPTOTHYREA (n. g.) Kraatz, l. c., p. 72 (genre fondé
 sur l'*Oxythyrea Perroudi* Schaum et une espèce
 nouvelle).
- L. sticticollis* Kraatz, l. c., p. 73. ?
374. STICHTHYREA (n. g.) Kraatz, l. c., p. 73 (genre à
 placer entre *Leptothyrea* et *Oxythyrea*).
- S. picticollis* Kraatz, l. c., p. 74. Afrique orient.
- ACROTHYREA (n. g.) Kraatz, l. c., p. 76 (genre créé
 pour la *Leucocelis rufofemorata* Burm.).

- MICROTHYREA (n. g.) Kraatz, l. c., p. 76 (genre créé pour un groupe de *Leucocelis*).
- *M. amabilis* var. *picticollis* Kraatz, l. c., p. 78. Zanzibar.
375. *Capnisa depressiuscula* Kraatz, l. c., p. 81. Turkestan.
376. *Microdera margelanica* Kraatz, l. c., p. 81. —
377. — *Heydeni* Kraatz, l. c., p. 82. —
378. *Alcinoë spectabilis* Kraatz, l. c., p. 82. Turcomanie.
- *Cyphogenia Kraatzii* var. *brevicostata* Kraatz, l. c., p. 83. Turkestan.
- — *brevicostata* var. *unicostata* Kraatz, l. c., p. 84. —
379. *Platyscelis margelanica* Kraatz, l. c., p. 84. —
380. *Pimelia pachyscelis* Kraatz, l. c., p. 85. —
381. — *simulatrix* Kraatz, l. c., p. 85. —
382. *Pachyscelis major* Kraatz, l. c., p. 86. —
383. — *nitidula* Kraatz, l. c., p. 86. —
384. *Thriptera Ballionis* Kraatz, l. c., p. 87. —
385. *Trigonoscelis laeviuscula* Kraatz, l. c., p. 87. —
386. — *planiuscula* Kraatz, l. c., p. 88. —
387. *Lasiostota affinis* (Ballion in litt.) Kraatz, l. c., p. 89. —
388. — *simillima* Kraatz, l. c., p. 89. —
389. — *carinata* Kraatz, l. c., p. 89. —
390. — *laticollis* Kraatz, l. c., p. 90. —
391. — *granulata* Kraatz, l. c., p. 90. —
392. PLATYNOSCELIS (n. g.) Kraatz, l. c., p. 91 (genre voisin des *Platyscelis*).
- P. helopioides* Kraatz, l. c., p. 92. —
393. *P. lucidicollis* Kraatz, l. c., p. 92. —
394. FAUSTIA (n. g.) Kraatz, l. c., p. 92 (genre voisin des *Platyscelis*).
- F. modesta* Kraatz, l. c., p. 93. —
395. *Zophosis lata* Kraatz, l. c., p. 94. —
396. — *persica* Kraatz, l. c., p. 94. Perse.
397. *Blaps longicornis* Kraatz, l. c., p. 95. Turkestan.
398. *Prosodes parallelocollis* Kraatz, l. c., p. 95. —
399. *Trigonoscelis submuricata* (nov. sp. ?) Kraatz, l. c., p. 95. —
400. CHETOMALACHIUS (n. g.) Kraatz, l. c., p. 96 (genre de la tribu des *Malachiides*).
- C. dasytoides* Kraatz, l. c., p. 97. —
401. EULOBONYX (n. g.) Kraatz, l. c., p. 97 (genre de la tribu des *Dasytides*).
- E. Turkestanicus* Kraatz, l. c., p. 98. —
402. *Cerallus Kiesenwetteri* Kraatz, l. c., p. 98. —

403. *Adesmia lævicollis* Kraatz, l. c., p. 107. Turkestan.
 404. — *Baudii* Kraatz, l. c., p. 106 (*A. Fager-*
gremii var. *A. Baudi*). Perse.
 405. *Dicerca obtusa* Kraatz, l. c., p. 112. Turkestan.
 406. *Sphenoptera margelanica* Kraatz, l. c., p. 112. —
 407. — *olivacea* Kraatz, l. c., p. 113. —
 408. *Trichodes Turkestanicus* Kraatz, l. c., p. 113. —
 409. *Podonta tenuis* Kraatz, l. c., p. 114. —
 410. *Callidium scabrum* Kraatz, l. c., p. 115. —
 411. *Oberea semirufa* Kraatz, l. c., p. 115. —
 412. *Phytoecia nivea* Kraatz, l. c., p. 116. —
 413. *Cryptocephalus rufus* Kraatz, l. c., p. 116. —
 414. *Galeruca Margelanica* Kraatz, l. c., p. 117. —
 415. *Meloë curticollis* Kraatz, l. c., p. 117. —
 416. *Tachypus abnormicollis* v. Heyden, Id. Id., p. 118. —
 417. APHARUS (n. g.) Reitter, Id. Id., p. 129 (voisin du
 genre *Hamotus* Aubé).
A. Mülleri Reitt., l. c., p. 130. Brésil.
 418. *Hamotus gracilicornis* Reitt., l. c., p. 131. Colombie.
 419. — *monachus* (Saulcy in litt.) Reitt., l. c.,
 p. 131. Yucatan.
 420. — *clavicornis* Reitt., l. c., p. 132. Venezuela.
 421. — *tritonus* Reitt., l. c., p. 132. Colombie.
 422. — *singularis* Reitt., l. c., p. 133. Mexique.
 423. *Batrisus (Syrbatus) clypeatus* Reitt., l. c., p. 134. Brésil.
 424. — — *Phantasma* Reitt., l. c., p. 135. —
 425. — — *sublyratus* Reitt., l. c., p. 135. —
 426. — — *simplicifrons* Reitt., l. c.,
 p. 136. —
 427. — — *calcarifer* Reitt., l. c., p. 136. —
 428. — — *brevispinus* Reitt. l. c., p. 137. —
 429. — (*Arthmius*) *tripunctatus* Reitt., l. c.,
 p. 137. Colombie.
 430. — — *Luzeræ* Reitt., l. c., p. 138. —
 431. — — *bicolor* Reitt., l. c., p. 139. Brésil.
 432. *Decarthron bipunctatum* Reitt., l. c., p. 142. Colombie.
 433. *Bryaxis nasuta* Reitt., l. c., p. 142. Magdalena.
 434. — *biclavata* Reitt., l. c., p. 143. Bogota.
 435. *Xybaris spiniceps* Reitt., l. c., p. 143. Brésil.
 436. — *troglocera* Reitt., l. c., p. 144. Colombie.
 437. *Batrybraaxis fortis* Reitt., l. c., p. 145. Brésil.
 438. — *curtula* Reitt., l. c., p. 146. —
 439. *Rhexius procerus* Reitt., l. c., p. 146. —
 440. — *Simonis* Reitt., l. c., p. 148. —

441. *Rhexius rugulosus* Reitt., l. c., p. 149. Colombie.
442. TRIMIOPSIS (n. g.) Reitt., l. c., p. 149 (très voisin de
Trimium).
T. claviceps Reitt., l. c., p. 150. —
443. GASOLA (n. g.) Reitt., l. c., p. 150 (voisin de *Sagola*
et de *Faronus*).
G. Simoni Reitt., l. c., p. 151. Brésil.
444. *Euconnus fimbriatulus* Reitt., l. c., p. 151. —
445. — *conicus* Reitt., l. c., p. 152. —
— *Megapenthes Volxemi* var. *Retowskii* v. Heyden,
Id. Id., p. 155. Crimée.
446. *Agriotes Tauricus* v. Heyden, l. c., p. 155. —
— *Phylloocta viennensis* var. *Cornelii* Weise, Id. Id.,
p. 158. Allemagne.
447. *Magdalis Weisei* Schreiner, Id. Id., p. 159. —
448. *Odontalgus Raffrayi* Reitt., Id. Id., p. 177. Afrique occid.
449. *Ctenistes Imitator* Reitt., l. c., p. 179. —
450. — (*Sognorus*) *Simonis* Reitt., l. c., p. 179. —
451. *Desimia subcalva* Reitt., l. c., p. 180. —
452. *Centrophthalmus grandis* Reitt., l. c., p. 181. —
453. — *dominus* Reitt., l. c., p. 183. —
454. — *barbatus* Reitt., l. c., p. 183. —
455. *Batrisus deformis* Reitt., l. c., p. 184. —
456. PANAPHYSIS (n. g.) Reitt., l. c., p. 185 (voisin de
Batrisus).
P. Koppi Reitt., l. c., p. 186. —
457. *Pselaphus filipalpis* Reitt., l. c., p. 187. —
458. *Bryaxis Rosmarus* Reitt., l. c., p. 187. —
459. — *picticornis* Reitt., l. c., p. 188. —
460. — *Schlerethi* Reitt., l. c., p. 189. —
461. — *pulvinata* Reitt., l. c., p. 189. —
462. *Acamaldes bythinoides* Reitt., l. c., p. 191. —
463. *Euplectus Strix* Reitt., l. c., p. 192. —
464. — *biformis* Reitt., l. c., p. 192. —
465. *Dineutes pectoralis* Régimb., Gyrin. nouv. de la
coll. du Mus. Civ. de Gênes, 20 feb-
braio 1882, p. 1. Nouv.-Guinée sept. occ.
466. *Enhydrus Albertisi* Régimb., l. c., p. 1. Nouv.-Guinée mér.
467. *Orectochilus Gestroi* Régimb., l. c., p. 3. Bornéo.
468. — *angulatus* Régimb., l. c., p. 3. —
469. — *pubescens* Régimb., l. c., p. 4. —
470. — *pusillus* Régimb., l. c., p. 5. —

471. *Carabus phædimus* Schauf. (= *C. Mniszechi* Kinderm. in litt.) Nunq. Otios, III, p. 520. Asie Mineure.
- — *Nordmanni* Chaud., var. *triumphator* Schauf., l. c., p. 523. —
- — var. *perfectus* Schauf., l. c., p. 524. —
- — var. *ducalis* Schauf., l. c., p. 524. —
- — var. *callipeplus* Schauf., l. c., p. 525. —
- — var. *semirugosus* Schauf., l. c., p. 525. —
- — var. *extremus* Schauf., l. c., p. 525. —
472. — *sexpunctatus* Schauf., l. c., p. 526. —
- — *Stjernvalli* Mannh. var. *Raddeanus* Schauf., l. c., p. 526. Caucase.
- — var. *enops* Schauf., l. c., p. 526. —
- *Hydrobius fuscipes* L. var. *balearicus* Schauf., l. c., p. 528. Iles Baléares.

REMARQUES SYNONYMIQUES.

EX RÉGIMBART :

(Notes from the Leyden Museum, IV, Jan. 1882, p. 66.)

Orectochilus subsulcatus Régimb. = *O. marginipennis* Aubé.

EX CANDÈZE :

(Élatérides nouveaux, 3^e fascicule.)

Page 22 : *Chalcolepidius virens* Fabr. doit être considéré comme espèce distincte, et non comme variété du *porcatus* Linn.

Page 70 : Les genres MEGAPENTHES et MELANOXANTHUS pourraient être réunis en un seul (MELANOXANTHUS Eschs., 1836).

A distraire du G. ELATER : *E. insignitus* Fairm. (G. ANTITYPUS Cand. in coll.) et *E. coccineus* Cand. (G. PARELATER Cand. in coll.)

Page 74 : *Agriotes scapulatus* doit être placé parmi les BETAR-MON.

Page 99 : *Cardiophorus Mastersi* M. L. doit être placé à côté du G. DIADYSIS Cand., et constituer un genre spécial (MICRODESMES Cand. in coll.).

EX CH. BRISOUT :

(Bull. Soc. Entom. de France, 8 février 1882, p. 30 et suiv.)

Cryptophagus montanus Ch. Bris. = *lapidarius* Reitt.

— *lapidarius* Fairm. = *gracilis* Reitt.

Cryptophagus punctipennis Ch. Bris. est une espèce distincte et non une variété du *pilosus* Gyll.

— *Mascarensis* Reitt. semble être une variété du *cellaris* Scop.

— *Brucki* Reitt. a été répandu jadis sous le nom de *Syriacus* Ch. Bris. *in litt.*

— *umbratus* Er. pourrait bien être une variété du *distinguendus* St.

— *villosula* Heer (= *Paramecosoma pilosula* Er.) est un vrai *Cryptophagus*.

Atomaria Berolinensis Kraatz paraît distincte de l'*atricapilla*.

Meligethes marrubii Ch. Bris. = *spinipes* Reitt.

— *parvulus* Ch. Bris. (*niger* Ch. Bris.) n'a aucun rapport avec le *memnonius* Er.

EX L. VON HEYDEN :

(Bull. Soc. Ent. de France, 8 février 1882, p. 34.)

Serica luteipes Fairm. (Ann. S. Ent. Fr., 1881, XXVI) = *Trio-donta alni* Blanck.

M. DES GOZIS (Bull. Soc. Ent. France, 22 fév. 1882, p. 42) croit indispensables les changements de *Corticus* et *Cteniopus* en *Horri-mantus* et *Sarandonyx*.

EX KRAATZ :

(Deutsche Ent. Zeits., 1882, I, p. 55.)

Tropiphorus obtusus Bonsd. *Tropiphorus elevatus* Herbst.

= *lepidotus* Herbst.

= *mercurialis* Fabr.

= *mercurialis* Stierl.

= *abbreviatus* Stierl.

EX WEISE :

Deutsche Ent. Zeits., 1882, I, p. 56.

- *Cyaniris thoracica* Küst. = *C. xanthaspis* Germ.

EX KRAATZ :

(Deutsche Ent. Zeits., 1882, I, p. 58 et suiv.)

Page 58 : A mettre en synonymie de *Pentodon Idiota* Herbst (*Monodon* Fabr.) les *P. tauricus* Motsch., *ventricosus* Motsch., *subdilatus* Motsch., *curtus* Motsch., et probablement aussi le *P. anthracinus* Reiche.

Pages 63-64 : *Pentodon emarginatus* Küst. = *P. videns* Pallas.

Pages 79-80 : *Leucocelis dysenterica* Boh. (non Mac Leay),

L. amethystina Mac Leay et *L. nitidula* Ol. sont des espèces distinctes et non des variétés de *L. hæmorrhoidalis* Fabr.

Pages 119-120 : *Gnathosia glabra* Fisch. est une *Capnisa*. *Trigonoscelis echinata* (Karel.) Fisch. est une *Ocnera*. *Diesia Karelini* Fisch. = probablement *sexdentata* Fisch. *Platyscelis labialis* Fisch est un *Zabrus*.

EX REITTER :

(Deutsche Ent. Zeits., 1882, I, p. 144.)

Byraxis Reitt., 1880 = *Eupines* King.

EX KRAATZ :

(Deutsche Ent. Zeits., 1882, I, p. 156-157.)

Magdalis tridentatus Grادل., Entomol. Nachr., 1881, Heft 21, p. 302 = *carbonaria* L.

Platynus chalybæus Grادل., l. c., p. 303 = *Mülleri* Herbst var. *cærulescens* Letzner, 1851.

Melasoma Lapponicum var. *cæruleum* Grادل., l. c., p. 306, est la variété *Bulgharense* de Fabricius.

— var. *hæmorrhoidale* Müller est la variété bleue de *Mel. cœneum*.

Cryptocephalus flavipes var. *Kowarzi* Grادل., l. c., p. 307, est probablement un *quadripustulatus* sans tache.

Carabus purpurascens var. *Palliardii* Grادل., l. c., p. 308, est simplement à rayer.

Monohammus peregrinus Grادل., l. c., p. 301 = *galloprovincialis*?

EX WEISE :

(Deutsche Ent. Zeits., 1882, I, p. 157-158.)

Phyllosecta viennensis Schrank et *P. vulgatissima* sont deux espèces distinctes.

EX REITTER :

(Deutsche Ent. Zeits., 1882, I, p. 161 et suiv.)

Page 161 : *Coluocera punctata* Märkel est une espèce distincte de la *formicaria*.

— 162 : *Anommatus Kiesenwetteri* Reitt. est une espèce distincte de *A. pusillus*.

A. Baudii Reitt. est une espèce toute différente de *A. 12-striatus*, mais pourrait être identifiée à *A. Dieckii*.

Abromus Reitt. doit être considéré comme genre distinct et non comme division du *G. Anommatus*.

Page 163 : *Langelandia incostata* Perris et *L. exigua* Perris sont deux espèces distinctes.

— 164 : *Cartodere parallelipennis* Solsky = *pilifera* Reitt.
C. Godarti Belon = *bicostata* Reitt.

Remplacez *Cartodere elegans* Reitt. non Aubé, par
C. Beloni Reitt.

— 165 : *Amartus* Horn. = *Brachyleptus* Motsch.

— 169 : *Pocadius limbatus* et *breviusculus* Reitt. sont deux espèces distinctes de *P. helvolus* Erichson.

— 170 : *P. dorsalis* Horn = *P. fulvipennis* Er.

Meligethes rufimanus Lec. = *M. Brassicæ* Scop.

Smicrips palmicola Lec. = *Tisiphone hypocoproides* Reitt.

— 171 : *Rhizophagus corpulentus* Reitt. n'a rien de commun avec *Hesperobænus abbreviatus* Motsch., mais est un *Bactridium*, peut-être le *striolatum*.

Le genre *Mimema* Woll. doit rentrer dans *Hesperobænus* Lec.

Phiconomus subtestaceus et *luridipennis* sont des *Hesperobænus*.

Bactridium orientalis Reitt. est un *Mimemodes*.

— 180 (note) : Remplacez par *Desimia* le nom de *Tetracis* Sharp., employé déjà par Gené pour un genre de Lépidoptères.

Ex SCHAUFUSS :

(Nunquam Otiosus, III, p. 513 et suiv.)

Employez pour le *Carabus Bonplandi* Mén. le nom de *Spinolæ* Cr. et J.

Mettez en synonymie de *Carabus Nordmanni* Chaud. les *C. productus* Hampe et *robustus* Deyr.

C. Bartholomei Motsch. est une variété de *C. Stjernvalli* Mannh.



Nous prions les auteurs de nous envoyer un exemplaire de leurs travaux sur les Coléoptères, *immédiatement après la publication*, la liste des espèces nouvelles étant donnée dans la *Revue Coléoptérologique* à l'époque de la distribution des tirés à part, lorsque

ceux-ci sont répandus avant la publication des ouvrages dans lesquels ils doivent être insérés.

* * *

Afin d'éviter les ennuis des recouvrements par la poste, nous prions les abonnés qui n'auraient pas encore envoyé le montant de l'abonnement, de le faire avant la publication du n° 3 de la *Revue Coléoptérologique* (25 avril).

Corrections au n° 1 de la Revue Coléoptérologique.

Page 7, ligne 12. — Au lieu de : November 2nd 1882, lisez : November 2nd 1881.

Page 11, Rem. syn., ex v. Heyden. — Au lieu de : Ctenopus, lisez : Cteniopus.

— Nécr., J. Putzeys, ligne 9. — Au lieu de : Cicindélites, lisez : Cicindélètes.



REVUE COLÉOPTÉROLOGIQUE

PUBLIÉE PAR

Constant VAN DEN BRANDEN

ET PARAISSANT TOUS LES MOIS

PRIX D'ABONNEMENT : Par an : pour la Belgique, 8 francs ; pour l'étranger, 10 francs. — S'adresser, à Bruxelles, chez M. C. Van den Branden, 69, rue de la Madeleine, ou à Berlin, à la librairie R. Friedländer & Sohn, 11, Carlstrasse. — Pour tous renseignements ou communications, s'adresser à M. C. Van den Branden.

BIBLIOGRAPHIE.

The Entomologist. — Vol. XV, n° 226; March 1882. — W.-W. Fowler : Natural Localities of British Coleoptera, p. 60. — Economic Entomology, p. 72.

The Entomologist's Monthly Magazine. — Vol. XVIII, n° 214; March 1882. — H.-W. Bates and D. Sharp : Notes on the Entomology of Portugal ; VII, Coleoptera, p. 230. — E.-P. Collett : Notes on the Coleoptera of the Hastings district, p. 234. — E.-A. Butler : Reoccurrence of *Polystichus vittatus* at St-Leonards, p. 235. — Information for Coleopterists, p. 235. — J.-W. Douglas : Measurements in Descriptive Entomology, p. 236. — R. Mac Lachlan : Id., p. 237. — The New Zealand Journal of Science, p. 238.

The Annals and Magazine of Natural History. — Vol. IX, n° 51 ; March 1882. — C.-O. Waterhouse : New Genera and species of Buprestidæ and Heteromera, p. 172.

Revista da Sociedade de Instrucção do Porto. — Segundo anno, n° 3, 1 de Março de 1882. — Paulino d'Oliveira : Catalogue des insectes du Portugal (suite des Carabiques), p. 94.

D^r L.-W. Schaufuss : *Pselaphiden und Scydmaeniden* der Niederländischen Besitzungen auf den Sunda-Inseln, im Reichsmu-

seum zu Leyden. — Haag, 1882. — (Tijdschrift voor Entomologie), vol. XXV, p. 65 à 76.

S. de Marseul : *Espèces nouvelles* de Coléoptères de la famille des Pédilides et Anthicidés du Musée royal d'Histoire naturelle à Leyde. — La Haye, 1882 (Tijds. v. Entomol., vol. XXV, p. 54 à 64).

Feuille des Jeunes Naturalistes. — N° 137, 1^{er} mars 1882. — Des Gozis : Synopsis du genre *Tropideres* Schoenherr et description d'une espèce nouvelle, p. 58. — Communications : Ch. Riveau : Voracité des Carabides, p. 61. — H. du Buysson : *Hesperophanes nebulosus*, p. 61. — A. Tholin : Chasse dans un tilleul, p. 62. — R. de Tinseau : Chasses entomologiques aux environs d'Hyères, p. 63. — Du Brossay : Notes diverses, p. 63. — Liste d'échanges. — Échanges.

Il Naturalista Siciliano. — N. 6; 1 Marzo 1882. — F. Baudi : Note Entomologica (continua), p. 127. — Abeille de Perrin : Supplément à la monographie des Malachides d'Europe et des pays voisins (suite), p. 137. — E. Ragusa : Notizia, p. 144. — T. De Stefani : Cenni bibliografici, p. 25.

The American Naturalist. — Vol. XVI, N° 3; March 1882. — Entomological Notes : C.-V. Riley : Further Notes on the Imported Clover-leaf Weevil (*Phytonomus punctatus*), p. 248.

D^r L.-W. Schaufuss : Zoologische Ergebnisse von Excursionen auf den Balearen. I (Verhandl. der K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien, 1881, p. 619 à 624, planche XXI, fig. 39 à 41).

D^r L.-W. Schaufuss : *Pselaphinorum Spuriorum Monographia* (Ann. Mus. civ. di St. nat. di Genova, Vol. XVIII, p. 166 à 172).

D^r L.-W. Schaufuss : *Pselaphidarum Monographiæ* (Ann. mus. civ. St. nat. Genova, XVIII, p. 173 à 206).

Annales de la Société Entomologique de Belgique. — T. XXV, Bruxelles, 1881 (distribué en mars 1882). — A. Preudhomme de Borre : Liste des Criocérides recueillies au Brésil par feu Camille Van Volxem, suivie de la description de douze nouvelles espèces américaines de cette tribu, p. 74. — A. Chevrolat : Description de Curculionides de Zanguebar, p. 85. — E. Dugès : Métamorphoses de l'*Exema* dispar, p. 5, planche I, A.

Société Entomologique de Belgique : Comptes-rendus des séances. — Assemblée mensuelle du 4 mars 1882. — L. Fairmaire : Coléoptères récoltés en Afrique centrale par M. Burdo, p. XLIII. — A. Preudhomme de Borre : Analyse et résumé d'un mémoire de M. le D^r G.-H. Horn sur les Carabidæ, p. LX. — Anomalies observées chez des *Carabus auratus*. — P. de Borre : Note sur l'*Anchomenus distinctus*, p. LXXIII.

Le Naturaliste. — 4^e année, n^o 5; 1^{er} mars 1882. — Académie des Sciences : Recherches pour servir à l'histoire de la génération chez les insectes (M. Jobert), p. 35. — Un vrai aveugle qui a recouvré la vue, p. 39. — Offres et demandes. — Livres nouveaux.

Id. — N^o 6; 15 mars 1882. — L. Fairmaire : Diagnoses de Coléoptères Abyssins, p. 48.

Société Entomologique de France, 1882. — N^o 5. Banquet destiné à célébrer le 50^e anniversaire de sa fondation, p. 49 : Joissance et Tribulations d'un Entomologiste, p. 53. — *Bulletin des séances* : Séance du 8 mars 1882. — H. Lucas : Note sur un Coléoptère du genre *Anthia*, p. 57. — A. Raffray : Description de trois nouvelles espèces de Coléoptères, p. 57. — Maurice Girard : Note sur des *Apaté*, p. 58. — Élections de membres honoraires, p. 61. — Bulletin bibliographique, p. 64.

Id. — N^o 6. — Séance du 22 mars 1882. — D^r Sénac : Diagnoses de trois espèces nouvelles de *Pimelia*, p. 67. — Künckel d'Hercule : Ravages de l'*Otiorhynchus sulcatus*, p. 69. — Valéry Mayet : Note sur les métamorphoses des *Dorcadiens*, p. 70. — de la Peraudière : Mœurs et métamorphoses de la *Psoa Blanchardi*, p. 71. — C.-E. Leprieur : *Cryptocephalus senegalensis* en Égypte, p. 72.

Nunquam Otiosus, p. 529-544 ausgeg. 31. März 1882. — L.-W. Schaufuss : Zoologische Ergebnisse von Excursionen auf den Balearen, III (Fortsetzung).

Revue d'Entomologie, publiée par la Société française d'Entomologie. — Tome I^{er}, 1882, n^o 1. — A. Raffray : Psélaphides nouveaux ou peu connus, p. 1. — E. Abeille de Perrin : Sur les *Bathyscia* des Alpes-Maritimes, p. 17. — A. Fauvel : Staphylinides recueillis par M. A. Montandon, dans les Karpathes, près *Brosstenii*, p. 19. — Bellier de la Chavignerie : Excursions; coléoptères d'Hyères, p. 23. — A. Fauvel : Nécrologie; l'abbé Clair, p. 23. — Nouvelles, p. 24. — A. Fauvel : Faune gallo-rhénane; Coléoptères, tome II, p. 1 à 4 (Cicindélides).

Id. — N^o 2. — A. Raffray : Psélaphides nouveaux ou peu connus, p. 25. — H. von Kiesenwetter : Voyage entomologique dans le midi de la France, le Mont-Serrat et les Pyrénées (résumé de l'allemand par A. Fauvel), p. 41. — L. Bleuse : Description d'un *Acupalpus* nouveau du centre de la France, p. 44. — A. Fauvel : Bibliographie, p. 46. — Nouvelles, p. 48. — A. Fauvel : Faune gallo-rhénane, t. II, p. 5 à 12 (Cicindélides).

Id. — N^o 3. — A. Raffray : Psélaphides nouveaux ou peu connus, p. 49. — H. von Kiesenwetter : Voyage entomologique dans le midi de la France, le Mont-Serrat et les Pyrénées (résumé

de l'allemand par A. Fauvel), p. 65. — Dr Ch. Raoult : De l'emploi de l'acide sulfureux, p. 68. — A. Fauvel : Description d'un *Trechus* nouveau de l'Aveyron, p. 70. — Bibliographie, p. 72. — Nouvelles, p. 72. — A. Fauvel : Faune gallo-rhénane, t. II, p. 13 à 20 (*Cicindélides*, *Carabides*).

ESPÈCES NOUVELLES.

473. *Ptosima Bowringii* Waterh., Ann. a. Mag. Nat. Hist., March 1882, p. 172. Chine.
474. — *apicata* Waterh., l. c., p. 172. Inde?
- ANCYLOTELA (n. g.) Waterh., l. c., p. 173 (genre de la famille des Buprestides, à placer près de *Tyndaris*).
475. *A. oculata* Waterh., l. c., p. 173. Chili.
- HOMEOGENUS (n. g.) Waterh., l. c., p. 174 (genre de la famille des Ténébrionides, à placer près de *Taraxides* Waterh.).
476. *H. laticorne* Waterh., l. c., p. 174. Sumatra.
- EULYTUS (n. g.) Waterh., l. c., p. 175 (genre voisin de *Eupezus*, tribu des Amarygminæ).
477. *E. nodipennis* Waterh., l. c., p. 175. Afrique orient.
- *Carabus antiquus* Dej. var. *Vieiræ* Paul. d'Oliveira, Rev. Soc. Instruc. Porto, 1882, n. 3, p. 96. Portugal.
- *Nebria brevicollis* F. var. *Iberica* P. d'Oliveira, l. c., p. 101. —
478. *Bythinus atomus* Schauf., Tijdschrift v. Entom., XXV, p. 65. Batavia.
479. *Panaphantus squamiceps* Schauf., l. c., p. 66. —
480. *Zethus Batavianus* Schauf., l. c., p. 67. —
481. *Euplectus acuminatus* Schauf., l. c., p. 69. —
482. *Batrisus Ritsemæ* Schauf., l. c., p. 70. Sumatra.
483. — *fundabraccatus* Schauf., l. c., p. 71. Batavia.
484. — *sculpturatus* Schauf., l. c., p. 71. Java.
485. *Enoptostomus javanus* Schauf., l. c., p. 73. —
486. *Ctenistes mitis* Schauf., l. c., p. 74. Batavia.
487. *Eumicrus epopsimus* Schauf., l. c., p. 74. —
488. *Xylophitus fasciolatus* de Marseul, Tijds. v. Entomol., XXV, p. 54. Java.
489. *Macratria lineella* Mars., l. c., p. 55. —
490. — *soricina* Mars., l. c., p. 56. Iles Arou.
491. — *bicincta* Mars., l. c., p. 56. Iles Philippines.
492. *Tomoderus fusicornis* Mars., l. c., p. 57. Sumatra.

493. *Mecynotarsus bisetiger* Mars., l. c., p. 58. Sumatra.
 494. — *obliquemaculatus* Mars., l. c., p. 59. Indes or.
 495. *Anthicus serricornis* Mars., l. c., p. 59. Sumatra.
 496. — *cruciellus* Mars., l. c., p. 60. Java.
 497. — *subrubrocinctus* Mars., l. c., p. 61. Sumatra.
 498. — *Javanus* Mars., l. c., p. 62. Java.
 499. — *bizonellus* Mars., l. c., p. 63. —
 500. — *Bataviensis* Mars., l. c., p. 63. —
 501. *Limnebius simplex* Baudi, Il Nat. Sicil, 6, Marzo
 1882, p. 127. Sicile.
 502. *Ochthebius opacus* Baudi, l. c., p. 129. Italie.
 503. *Hydræna spinipes* Baudi, l. c., p. 130. —
 504. *Anthocomus gratissimus* Abeille de Perrin, Il Nat.
 Sicil., 6, Marzo 1882, p. 137. Syrie.
 505. — *semipolitus* Abeille de P., l. c., p. 138. —
 506. *Axinotarsus alticola* Abeille de P., l. c., p. 138. —
 507. *Antholinus (Attalus) Tenietensis* Abeille de P.,
 l. c., p. 139. Algérie.
 508. *Attalus perforatus* Abeille de P., l. c., p. 140. —
 509. — *coloratus* Abeille de P., l. c., p. 140. Iles Baléares.
 — *Bembidion minimum* F. var. *quadriscopilotum*
 Schauf., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1881,
 p. 620. —
 — *Agabus nebulosus* Först. var. *pratensis* Schauf.,
 l. c., p. 620. —
 510. *Helophorus Punientanus* Schauf., l. c., p. 620. —
 511. — *filitarsis* Schauf., l. c., p. 621. —
 512. *Stenus tythus* Schauf., l. c., p. 621. —
 — *Agriotes sordidus* Ill. var. *scutellatus* Schauf.,
 l. c., p. 622. —
 513. *Lasioderma bicolor* Schauf., l. c., p. 622. —
 — *Asida depressa* Sol. var. *crenata* Schauf., l. c.,
 p. 623. —
 514. *Phylax balearicus* Schauf., l. c., p. 623. —
 ESPESON (n. g.) Schauf., Ann. Mus. Genova, XVIII,
 p. 168 (*Pselaphini Spurii*).
 515. *E. moratus* Schauf., l. c., p. 168, fig. a, b. I. St-Thomas.
 516. *Articeros aurifluus* Schauf., Ann. Mus. Genova,
 XVIII, p. 194. Melbourne.
 517. *Frustiger testudineus* Schauf., l. c., p. 199. Pozuzu.
 518. *Lema Chapuisi* Preud. de Borre, Ann. Soc. Ent.
 Belg., XXV, p. 75. Mexique.
 519. — *Villei* Preud. de Borre, l. c., p. 76. Ecuador.
 520. — *cubana* Preud. de Borre, l. c., p. 77. Cuba.

521. *Lema dimidiaticornis* Preud. de Borre, l. c., p. 78. Mexique.
 522. — *paraguayensis* Preud. de Borre, l. c., p. 78. Paraguay.
 523. — *ferrum-equinum* Preud. de Borre, l. c.,
 p. 79. Amérique.
 524. — *Volæmi* Preud. de Borre, l. c., p. 80. Brésil.
 525. — *atripes* Preud. de Borre, l. c., p. 81. —
 526. — *latemaculata* Preud. de Borre, l. c., p. 81. —
 527. — *Dugesi* Preud. de Borre, l. c., p. 82. Mexique.
 528. — *surinamensis* Preud. de Borre, l. c., p. 82. Surinam.
 529. *Crioceris rugicollis* Preud. de Borre, l. c., p. 83. Guatemala.
 530. *Polyclæis auriventris* Chevrolat, Ann. Soc. Ent.
 Belg., XXV, p. 86. Zanguebar.
 531. — *albicans* Chevr., l. c., p. 86. —
 532. *Stigmatotrachelus? Nabab* Chevr., l. c., p. 86. —
 EPIPEDOSOMA (n. g.) Chevr., l. c., p. 86 (*Otio-*
rhynchidæ).
 533. *E. Zanguebaricum* Chevr., l. c., p. 87. —
 534. *Systates? funicularis* Chevr., l. c., p. 87. —
 535. *Sphingodes niger* Chevr., l. c., p. 87. —
 536. *Peribrotus bilineellus* Chevr., l. c., p. 88. —
 537. *Rhytidophleus Oberthüri* Chevr., l. c., p. 88. —
 538. *Lixus buplicatus* Chevr., l. c., p. 88. —
 539. — *bifoveatus* Chevr., l. c., p. 89. —
 540. *Metatyges Hacquardi* Chevr., l. c., p. 89. —
 541. *Alcides latefasciatus* Chevr., l. c., p. 89. —
 542. — *orientalis* Chevr., l. c., p. 90. —
 543. — *erythropterus* Chevr., l. c., p. 90. —
 544. — *Wahlbergi* Chevr., l. c., p. 90. —
 545. — *tetragrammus* Chevr., l. c., p. 90. —
 546. — *simus* Chevr., l. c., p. 91. —
 547. *Camptorhinus sanguinolentus* Chevr., l. c., p. 91. —
 548. *Desmidophorus?(Tetracyphus)odontomus* Chevr.,
 l. c., p. 91. —
 549. *Sympiezopus albolineatus* Chevr., l. c., p. 92. —
 LIOCALANDRA (n. g.) Chevr., l. c., p. 92 (tribu des
 Calandrides).
 550. *L. nuda* Chevr., l. c., p. 92. —
 551. *Tetracha Morsii* Fairmaire, Bull. Soc. Ent. Belg.,
 4 mars 1882, p. XLIV. Afrique centrale.
 552. *Polyhirma pluricostata* Fairm., l. c., p. XLV. —
 553. *Anthia Burdoi* Fairm., l. c., p. XLV. —
 554. *Onthophagus laminiifrons* Fairm., l. c., p. XLVI. —
 555. *Adoretus seriegranatus* Fairm., l. c., p. XLVII. —
 556. *Trochatus cæneopiceus* Fairm., l. c., p. XLVII. —

557. *Psiloptera simplicicollis* Fairm., l. c., p. XLVIII. Afrique centr.
558. *Melyris incompleta* Fairm., l. c., p. XLIX. —
559. *Rhytinota acuticollis* Fairm., l. c., p. XLIX. —
560. — *gracillima* Fairm., l. c., p. XLIX (= *Mesostena gracillima* Ancy?) —
561. *Psammodes vagecostatus* Fairm., l. c., p. L. —
 PHYSOPHRYNUS (n. g.) Fairm., l. c., p. L (genre
 voisin des *Phrynocolus*).
562. *P. Burdoi* Fairm., l. c., p. L. —
563. *Sepidium brevicaudatum* Fairm., l. c., p. LI. —
564. *Utoma? fastidiosa* Fairm., l. c., p. LI. —
565. *Micrantereus luteopubens* Fairm., l. c., p. LI. —
566. *Pycnocerus cyanescens* Fairm., l. c., p. LI. —
567. *Systates nigrogranatus* Fairm., l. c., p. LI. —
568. — *granaticollis* Fairm., l. c., p. LI. —
569. *Brachycerus phrynopterus* Fairm., l. c., p. LI. —
570. *Cantharocnemis variolosus* Fairm., l. c., p. LIV. —
571. *Phyllocnema viridicostata* Fairm., l. c., p. LIV. —
572. *Ceroplesis malepicta* Fairm., l. c., p. LV. —
573. *Crossotus vestiticornis* Fairm., l. c., p. LVI. —
574. *Aulacophora conifera* Fairm., l. c., p. LVI. —
 METRIOPEPLA (n. g.) Fairm., l. c., p. LVII (voisin
 des *Calopepla*). —
575. *M. lividula* Fairm., l. c., p. LVII. —
576. *Cassida externeguttata* Fairm., l. c., p. LVIII. —
577. *Leucolaphus latifrons* Fairm., Naturaliste, 15 mars
 1882, p. 48. Abyssinie.
578. *Polyclæis Raffrayi* Fairm., l. c., p. 48. —
579. *Ceroplesis Atropos* Fairm., l. c., p. 48. —
580. *Closteromerus Raffrayi* Fairm., l. c., p. 48. —
581. *Cicindela viridis* Raffray, Bull. Soc. Ent. France,
 8 mars 1882, p. 57. —
582. *Calosoma caraboides* Raffr., l. c. p. 58. —
583. *Hylotorus Blanchardi* Raffr., l. c., p. 58. —
584. *Pimelia Indica* Sénac, id., 22 mars 1882, p. 67. Indes orient.
585. — *convexicollis* Sénac, l. c., p. 68. —
586. — *Raffrayi* Sénac, l. c., p. 68. Ethiopie.
 — *Doliceon biguttulum* var. *hilaris* Schauf., Nunq.
 Otios., März 1882, p. 529. Iles Baléares.
587. *Acritus balearicus* Schauf., l. c., p. 529. —
 HELIOCTAMENUS Schauf., l. c., p. 531 (n. gen.
Bothryderidarum).
588. *H. hippopotamus* Schauf., l. c., p. 531. —
589. *Elaphocera Capdeboni* Schauf., l. c., p. 533. —

- *Lyctus impressus* var. *capitalis* Schauf., l. c.,
p. 534. Iles Baléares.
590. *Asida Moraguezi* Schauf., l. c., p. 534. —
591. *Isocerus balearicus* Schauf., l. c., p. 535. —
592. *Xylophilus flicornis* Schauf., l. c., p. 536. —
— — var. *bicolor* Schauf., l. c.,
p. 536. —
593. *Eurychirus* (*Otiorrhynchus*) *Valdemosæ* Schauf.,
l. c., p. 537. —
594. — — — *Miramaræ* Schauf.,
l. c., p. 538. —
595. *Peritelus tenuicornis* Schauf., l. c., p. 539. —
BRADYCINETUS (n. g.) Schauf., l. c., p. 539 (genre
voisin de *Cathormiocerus*, *Trachyphlæus* et
Rhytidorrhinus).
596. *B. Ignatii* Schauf., l. c., p. 540. —
— *Brachycerus barbarus* L. var. *Ramosus* Schauf.,
l. c., p. 542. —
597. *Rhytidorrhinus modestus* Schauf., l. c., p. 543. —
598. *Symbiotes minutus* Schauf., l. c., p. 544. —
COMMATOCERUS (n. g.) Raffray, Revue d'Entom., I,
1881, 1, p. 1 (genre voisin de *Fustiger*).
599. *C. elegantulus* Raffr., l. c., p. 1, pl. I, fig. 1, 2, 3. Abyssinie.
CLAVIGEROPSIS (n. g.) Raffr., l. c., p. 3 (genres voi-
sins : *Claviger* et *Clavigerodes*).
600. *C. formicarius* Raffr., l. c., p. 4, pl. I, fig. 5. —
601. *Cyathiger sylvestris* Raffr., l. c., p. 4. Nouv.-Guinée.
SIMUS (n. g.) Raffr., l. c., p. 6 (genre voisin de
Rhexius).
602. *S. fracticornis* Raffr., l. c., p. 6, pl. II, fig. 6. Abyssinie.
OGMOCERUS (n. g.) Raffr., l. c., p. 7 (genre voisin
de *Simus* et de *Metopias*).
603. *O. giganteus* Raffr., l. c., p. 7, pl. II, fig. 7. —
604. *Tetracis? ventralis* Raffr., l. c., p. 8, pl. I, fig. 8. —
605. *Ctenistes deserticola* Raffr., l. c., p. 9. —
606. — *curvidens* Raffr., l. c., p. 10, pl. I, fig. 9,
et pl. II, fig. 10. —
607. *Tmesiphorus umbrosus* Raffr., l. c., p. 10. Java.
608. — *papuanus* Raffr., l. c., p. 11. Nouv.-Guinée.
609. — *armatus* Raffr., l. c., p. 11. Singapour.
610. — *denticornis* Raffr., l. c., p. 12, pl. I,
fig. 11, et pl. II, fig. 12. Abyssinie.
611. — *pubescens* Raffr., l. c., p. 13. Java.
612. *Pselaphus delicatulus* Raffr., l. c., p. 14. Abyssinie.

613. *Pselaphodes?* (*Atherocolpus* Raffr.) *foveolatus*
Raffr., l. c., p. 15, pl. I, fig. 13. Singapore.
614. *Pselaphodes?* (*Atherocolpus* Raffr.) *heterocerus*
Raffr., l. c., p. 16, pl. II, fig. 14, 15, 16. Java.
615. *Bathyscia Grouvellei* Abeille de P., id., id.,
p. 17. France mérid.
616. — — *brevicollis* Abeille de P., l. c., p. 19. —
617. *Centrophthalmus rubens* Raffr., id., n° 2, p. 25. Abyssinie.
618. — — *grandipalpis* Raffr., l. c., p. 26. —
619. — — *exilis* Raffr., l. c., p. 27. —
620. — — *monilis* Raffr., l. c., p. 27. —
- SUNORFA (n. g.) Raffr., l. c., p. 28 (à placer à côté
des *Bythinus*).
621. *S. capitata* Raffr., l. c., p. 28. Nouv.-Guinée.
622. *Tyrus clavatus* Raffr., l. c., p. 29. —
623. — — *javanicus* Raffr., l. c., p. 30. Java.
624. *Bryaxis circumflexa* Raffr., l. c., p. 32. Abyssinie.
625. — — *foveiventris* Raffr., l. c., p. 33. —
626. — — *villosula* Raffr., l. c., p. 34. Nouv.-Guinée.
627. — — *papuana* Raffr., l. c., p. 34. —
628. — — *pulla* Raffr., l. c., p. 35. Abyssinie.
629. — — *moluccana* Raffr., l. c., p. 35. Moluques.
630. — — *nitidissima* Raffr., l. c., p. 36. Java.
631. — — *lucida* Raffr., l. c., p. 37. Nouv.-Guinée.
632. — — *longipennis* Raffr., l. c., p. 37. —
- BATRISOMORPHA (n. g.) Raffr., l. c., p. 38 (genre
très voisin de *Bryaxis* et de *Batrisus*).
633. *B. foveicollis* Raffr., l. c., p. 39. Java.
634. *B. clavata* Raffr., l. c., p. 40. Nouv.-Guinée.
635. *B. pilosella* Raffr., l. c., p. 40. —
636. *Acupalpus lemovicensis* Bleuse, id. id., p. 44. France.
637. *Batrisomorpha crassicornis* Raffr., id., 3, p. 49. Nouv.-Guinée.
- STICTUS (n. g.) Raffr., l. c., p. 49 (genre très voi-
sin de *Batrisus*).
638. *Stictus punctatissimus* Raffr., l. c., p. 50. —
639. — — *denticollis* Raffr., l. c., p. 51. —
640. — — *femoralis* Raffr., l. c., p. 51. —
- CONNODONTUS (n. g.) Raffr., l. c., p. 52 (à placer
près des *Batrisus*).
641. *C. acuminatus* Raffr., l. c., p. 53, pl. II, fig. 17, 18. Abyssinie.
642. *Batrisus foveicollis* Raffr., l. c., p. 56. —
643. — — *hydropicus* Raffr., l. c., p. 56. —
644. — — *papuanus* Raffr., l. c., p. 57. Nouv.-Guinée.
645. — — *giganteus* Raffr., l. c., p. 57. Abyssinie.

646.	<i>Batrissus simplex</i>	Raffr., l. c., p. 58.	Nouv.-Guinée.
647.	—	<i>aethiopicus</i> Raffr., l. c., p. 59.	Abyssinie.
648.	—	<i>testaceus</i> Raffr., l. c., p. 59.	Nouv.-Guinée.
649.	—	<i>punctatissimus</i> Raffr., l. c., p. 60.	—
650.	—	<i>exiguus</i> Raffr., l. c., p. 61.	Java.
651.	—	<i>Moluccarum</i> Raffr., l. c., p. 61.	Moluques.
652.	—	<i>pubescens</i> Raffr., l. c., p. 62.	Java.
653.	—	<i>javanicus</i> Raffr., l. c., p. 63.	—
654.	—	<i>bicolor</i> Raffr., l. c., p. 63.	—
655.	—	<i>longipennis</i> Raffr., l. c., p. 64.	—
656.	<i>Trechus aveyronensis</i>	Fauvel, id., id., p. 70.	France.

REMARQUES SYNONYMIQUES.

EX PAULINO D'OLIVEIRA :

(Rev. Soc. Instruc. Porto, 1882, N. 3, p. 96.)

Carabus lusitanicus Dej. = *antiquus* Dej. var.

EX BAUDI :

(Il Natur. Sicil., N. 6, Marzo 1882, p. 128.)

Helophorus intermedius Muls. = *H. alternans* Géné.

EX SCHAUFUSS :

(Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 1884, p. 623.)

Asida ibizensis Perez-Arcas = *depressa* Sol. var.

EX SCHAUFUSS :

(Ann. Mus. Civ. Genova, XVIII, p. 183 et suiv.)

Articeros Odewahni Pascoe = *A. Fortnumi* Hope ♀.

— *Bostocki* Pasc. = *A.* — — ♂?

— *Ponticus* Sharp = *A. syriacus* Sauley.

EX SCHAUFUSS :

(Nunq. Otios., 31 März 1882.)

Page 533 : *DIOCHARES* Reitt. = *XENOSCELIS*.

Xenoscelis depressus Reitt. = *X. deplanatus* Woll.

Page 539 : *Scythropus balearicus* Schauf. = *Sc. Javelti* Desbr.?

— 543-544 : *Timarcha chalcosoma* Fairm. = *T. balearica* Gory?

EX RAFFRAY :

(Revue d'Entom., n° 2.)

Page 30 (note) : *Bryaxis ovalipennis* ♂ Schauf. pourrait être placé dans le genre *Decarthron* Brend.

Page 39 : *Bryaxis Armitagei* King (= *Batrisus pallidus* Schauf. i litt.) doit rentrer dans le genre *Batrisomorpha* Raffr.

EX FAUVEL :

(Faune gallo-rhénane, II.)

Page 10 : *Cicindela nemoralis* Oliv. = *littoralis* Fabr.

— 11 : — *sinuata* Dej. = *literata* Sulz.

— 12 : — *trisignata* Dej. est une espèce valable et non une race de la *literata* Sulz.

— 14 : — *sobrina* Gory = *germanica* Linn.

COMMUNICATIONS DIVERSES.

La Société Entomologique de France, sœur aînée de toutes les Sociétés d'Entomologie existantes actuellement, a célébré, le 28 février dernier, le cinquantième anniversaire de sa fondation.

* * *

Dans la séance du 8 mars 1882 de la même Société, les entomologistes suivants ont été proclamés membres honoraires :

MM. Charles Brisout de Barneville, le D^r Candèze, Victor Signoret et G. Thomson.

* * *

EXPLORATIONS. — Nous apprenons que M. Louis Petit, naturaliste déjà connu par ses découvertes sur la côte occidentale d'Afrique, est reparti pour le Congo. Les entomologistes qui désireraient avoir des insectes de ces contrées sont priés d'adresser leurs demandes d'acquisition à M. Louis Petit, à Landana (Congo).

M. le capitaine Cambier, qui avait rapporté de son voyage à Karéma, en Afrique centrale, un petit nombre d'insectes, vient de repartir pour Zanzibar, où il organisera, dit-on, les expéditions pour l'intérieur. Il est à espérer que ce vaillant officier songera à rendre un service à l'entomologie en récoltant le plus possible d'insectes.

* * *

COLLECTIONS. — Depuis quelque temps, plusieurs collections importantes ont changé de possesseurs. Nous croyons utile de faire

connaître les principaux changements aux Coléoptéristes : la collection de Carabiques du baron de Chaudoir est entre les mains de M. René Oberthür ; celle de Putzeys a été donnée à la Société Entomologique de Belgique ; la magnifique collection de coléoptères du comte de Mniszech a été acquise par M. Van Lansberge, qui ne conservera, paraît-il, que les Lamellicornes, Buprestides et Longicornes ; les Elatérides ont été cédés à M. le D^r Candèze, les Carabiques à M. René Oberthür, les Lycides à M. Bourgeois, etc., M. Clément Müller, de Dresde, possède la collection d'Hétéromères de Haag, et la collection de Solsky appartient actuellement à l'Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg.

MONOGRAPHIES : *Cicindélides*. — M. W. Dokhtoureff, secrétaire-archiviste de la Société Entomologique de Russie, prépare un travail sur les Cicindélides du monde et demande aux Coléoptéristes les matériaux qui peuvent lui être utiles.

Dytiscides. — Le monde entomologique attend avec impatience la monographie de M. Sharp sur les insectes de cette famille ; espérons que ce travail, annoncé depuis longtemps déjà, paraîtra bientôt.

Gyrinides. — M. le D^r Régimbart a terminé la première partie de la monographie de cette famille ; cette partie, qui comprend les Enhydrini (*Dineutes*, *Porrhorhynchus* et *Enhydrus*), va être remise à la Société Entomologique de France, qui doit faire paraître tout le travail accompagné de planches dans ses Annales. M. Régimbart continue à déterminer toutes les collections de Gyrinides qui lui sont envoyées.

Hydrophilides. — Depuis quelque temps, M. Bedel s'occupe spécialement de cette famille, l'une de celles qui réclament une prompte revision. Cet entomologiste a fait l'acquisition de plusieurs collections importantes d'Hydrophilides, et il est à souhaiter que la monographie de ces insectes ne se fera pas trop attendre.



REVUE COLÉOPTÉROLOGIQUE

PUBLIÉE PAR

Constant VAN DEN BRANDEN

ET PARAISSANT TOUS LES MOIS

PRIX D'ABONNEMENT : Par an : pour la Belgique, 8 francs; pour l'étranger, 10 francs. — S'adresser, à Bruxelles, chez M. C. Van den Branden, 69, rue de la Madeleine, ou à Berlin, à la librairie R. Friedländer & Sohn, 11, Carlstrasse. — Pour tous renseignements ou communications, s'adresser à M. C. Van den Branden.

BIBLIOGRAPHIE.

Notes from the Leyden Museum. — Vol. IV, Part II, april 1882. — Note VI; New species of Lycidæ, Lampyridæ and Telephoridæ from Sumatra, described by the Rev. H.-S. Gorham, p. 93. — Note VII: A new Sumatran species of the Clerid genus Callimerus, described by the Rev. H.-S. Gorham, p. 110. — Note VIII: New species of coleoptera belonging to the families Pedilidæ and Anthicidæ, described by S. de Marseul p. 112 (1). — Note IX: A new African species of the coleopterous genus Hister, described by S. de Marseul, p. 125. — Note XII: The Pselaphidæ and Scydmaenidæ from the Sunda-Islands in the Leyden Museum, by D^r L.-W. Schaufuss, p. 145 (2). — Note XIII: A new African species of the Coleopterous family Elateridæ, described by D^r E. Candèze, p. 158. —

(1) Ce travail a été publié, en français, dans le *Tijdschrift voor Entomologie*, vol. XXV, p. 54. La liste des espèces nouvelles a donc été donnée dans le n° 3 de cette *Revue*.

(2) Ce travail a été publié, en allemand, dans le *Tijdschrift voor Entomologie*, vol. XXV, p. 65. La liste des espèces nouvelles a été donnée dans le n° 3 de cette *Revue*.

Note XIV : Description of a new species of Apogonia discovered by M. L. Ritsema in Java, by D. Sharp, p. 159.

The Entomologist's Monthly Magazine. — Vol. XVIII, n° 215; avril 1882. — G.-F. Mathew : Entomological Notes from Teneriffe, St. Vincent, etc., p. 256. — W.-W. Fowler : *Corticaria Wollastoni* at Mablethorpe, etc., p. 261. — L.-D. Dunbar : *Oryctes nasicornis* at Wick, p. 262.

The Annals and Magazine of Natural History. — N° 52, avril 1882. — H.-W. Bates : New species of Geodephagous Coleoptera from North-west Mexico, p. 319. — Ch.-O. Waterhouse : Descriptions of new Cetoniidæ, Buprestidæ and Cerambycidæ from Madagascar, p. 321.

Revue d'Entomologie, publiée par la Société française d'Entomologie. — T. I^{er}, 1882, n° 4. — A. Raffray : Psélaphides nouveaux ou peu connus (suite et fin), p. 73. — D^r A. Puton : De l'insuffisance du caractère unique pour la distinction des espèces, p. 86. — A. Fauvel : Sur un cas exceptionnel de dimorphisme chez un Coléoptère (*Pachycorinus dimorphus*), p. 90. — Bibliographie, p. 94. — E. Abeille de Perrin : Nécrologie (R. de Tinseau), p. 95. — Nouvelles, p. 96. — A. Fauvel : Faune gallo-rhénane. Carabides (suite), p. 21 à 28.

Le Naturaliste. — 4^e année, n° 7; 1^{er} avril 1882. — C.-F. Ancey : Contributions à la faune de l'Afrique orientale; Descriptions de Coléoptères nouveaux, p. 54. — Livres nouveaux, p. 56.

The American Naturalist. — Vol. XVI, N° 4; April 1882. — General Notes, Entomology: Mode of Feeding of the larva of *Dytiscus*; Entomological Notes, p. 330.

Cucujides nouveaux du Musée civique de Gênes, par A. Grouvelle. — 24 pages, 1 planche (Ann. del Mus. civ. di St. nat. di Genova, Vol. XVIII, p. 275 à 296, pl VII).

Il Naturalista Siciliano. — N. 7; 1 Aprile 1882. — E.-Abeille de Perrin : Supplément à la Monographie des Malachides d'Europe et des pays voisins (suite), p. 145. — Cav. A. Senoner : Cenni Bibliografici, p. 31.

Sopra alcuni Coleotteri di Birmania raccolti dal Capitano G.-B. Comotto, per R. Gestro. — 23 pages (Ann. del Mus. civ. Genova, Vol. XVIII, p. 297 à 317).

Bulletin de la Société Impér. des Naturalistes de Moscou. — 1881, N° 3. — Moscou, 1882. — A. Becker : Reise nach dem südlichen Daghestan, p. 189.

The Entomologist. — Vol. XV, n° 227, April 1882. — W.-W. Fowler : Natural Localities of British Coleoptera, p. 75. — Entomological Notes, Captures, etc.: A. Sidney Olliff : *Plectroscelis aridula*; T.-R. Billups : *Callistus lunatus* at Reigate, p. 92.

Revista da Sociedade de Instrucção do Porto. — Segundo anno, N° 4; 1 de Abril de 1882. — M. Paulino d'Oliveira : Catalogue des insectes du Portugal (Carabiques, suite), p. 147.

Société Entomologique de Belgique : Comptes-rendus des séances. — Assemblée mensuelle du 1^{er} avril 1882. — Nécrologie : Dr Louis Fromont, p. LXXV. — A. Preudhomme de Borre : Bibliographie; Revue Coléoptérologique, p. LXXVI. — A. Preudhomme de Borre : Caractère nouveau pour la distinction des espèces belges du genre *Elaphrus*, p. LXXVIII. — A. Preudhomme de Borre : Note sur la capture du *Notiophilus quadripunctatus* en Belgique, p. LXXX. — H. Donckier : Sixièmes Addenda à la faune des Coléoptères de Belgique. p. LXXXI.

Le Naturaliste. — 4^e année; N° 8; 15 Avril 1882. — C. F. Ancey : Contributions à la faune de l'Afrique orientale, p. 62. — Livres nouveaux, p. 64.

Nunquam Otiosus, III, p. 545-560 ausgeg. 12. April 1882. — L.-W. Schaufuss : Zoologische Ergebnisse von Excursionen auf den Balearen (Fortsetzung), p. 545. — L.-W. Schaufuss : Neue Coleopteren-Arten und Varietäten, p. 552. — L.-W. Schaufuss : Notizen zu Caraben, p. 556. — L.-W. Schaufuss : *Hydroporus flavipes* Ol. und Varietäten, p. 558; *Synonyma*, p. 560; Notizen zum Catal. col. Europ. Stein und Weise Ed. 2., p. 560.

Société Entomologique de France. Séance du 12 Avril 1882. — A. Raffray, Descriptions de trois nouvelles espèces de Coléoptères propres à l'Abyssinie, p. 81. — H. Lucas : Note sur un Coléoptère de la famille des Carabides, p. 82. — H. Gadeau de Kerville : Note sur un Coléoptère anormal, p. 83. — J. Fallou : Ravages causés par la larve d'un Curculionite, p. 84. — Demaison et Raffray : Mœurs des *Heliocopris*, p. 85.

Wiener Entomologische Zeitung. I. Jahrgang, Wien 1882. — I. (Januar) — *Heft.* — L. Ganglbauer : Beiträge zur Synonymik der europäischen und caucasischen Cerambyciden, p. 5. — L. Ganglbauer : Ueber *Leptura oblongomaculata* Buq., und *L. trisignata* Fairm., p. 12. — II. (Februar) — *Heft.* — Edm. Reitter : Zwei neue caucasische Caraben, p. 25. — Edm. Reitter : Ueber *Malthodes brachypterus* Kiesw., mit einem Holzschnitt, p. 28. — Edm. Reitter : *Troglorrhynchus myops* nov. sp., p. 31. — Litteratur, p. 42. — III. (März) — *Heft.* — Edm. Reitter : Zur Nomenclatur der Varietäten, p. 65. — Edm. Reitter : Synonymische Notizen, p. 67. — L. Ganglbauer : Kleinere Mittheilungen, p. 68. — O. Retowski : Ueber *Elytrodon bidentatum* Stev., p. 69. — Litteratur : Allgemeines, p. 70; Coleoptera, p. 74. — IV. (April) — *Heft.* — L. Ganglbauer : Beiträge zur Kenntniss der Coleopteren-Fauna des Erzherzogthumes Oesterreich, p. 85. — Notizen, p. 104.

Annales de la Société Entomologique de France. — 1881; 4^e trimestre. — Paris, 12 avril 1882. — H. Brisout de Barneville : Essai monographique des espèces d'Europe et des confins de la Méditerranée du genre *Corticaria* (fin), p. 417. — L. Fairmaire : Essai sur les Coléoptères des îles Viti (fin), p. 461. — E. Allard : Essai de classification des Blapsides de l'ancien monde (suite), p. 493. — Bulletin des séances; bulletin bibliographique, liste des membres, tables, etc.

Transactions and Proceedings and Report of the Royal Society of South Australia. — Vol. IV, Issued January 1882. — S.-E. Holder: Descriptions of South Australian Staphylinidae, p. 77. — J.-G.-O. Tepper: Additions to the coleopterous fauna of South Australia, p. 140. — Abstract of Proceedings, p. 151.

Feuille des Jeunes Naturalistes. — 1^{er} avril 1882. — Des Gozis : Synopsis du G. Tropideres et description d'une espèce nouvelle, p. 65. — Communications : *Osmoderma eremita*; Insectes lignivores, p. 74. — Nécrologie, p. 75. — Liste d'échanges; échanges.

Société Entomologique de France: Séance du 26 avril 1882. — L. Fairmaire : *Otiorhynchus* nuisibles, p. 98. — A. Chevrolat : Descriptions de deux *Leucocera* nouvelles, p. 99. — H. Lucas : Capture d'*Exocentrus adspersus*, p. 100.

ESPÈCES NOUVELLES.

- | | | | |
|------|---------------------------------|--|----------|
| 657. | <i>Metriorrhynchus pellitus</i> | Gorham, Notes f. Leyd. Mus., IV, II, April 1882, Note VI, p. 93. | Sumatra. |
| 658. | — | <i>cinnabarinus</i> Gorh., l. c., p. 94. | — |
| 659. | — | <i>purpurascens</i> Gorh., l. c., p. 94. | — |
| 660. | — | <i>amœnus</i> Gorh., l. c., p. 95. | — |
| 661. | — | <i>luteus</i> Gorh., l. c., p. 95. | — |
| 662. | — | <i>infuscatus</i> Gorh., l. c., p. 96. | — |
| 663. | <i>Xylobanus reticulatus</i> | Gorh., l. c., p. 96. | — |
| 664. | — | (?) <i>dimidiatus</i> Gorh., l. c., p. 97. | — |
| 665. | — | <i>tinctus</i> Gorh., l. c., p. 97. | — |
| 666. | <i>Conderis miniatus</i> | Gorh., l. c., p. 98. | — |
| 667. | <i>Ditoneces rufo-brunneus</i> | Gorh., l. c., p. 99. | — |
| 668. | — | <i>tricolor</i> Gorh., l. c., p. 99. | — |
| 669. | — | <i>flavicolor</i> Gorh., l. c., p. 100. | — |
| 670. | <i>Lyropæus Waterhousei</i> | Gorh., l. c., p. 100. | — |
| 671. | — | <i>Ritsemæ</i> Gorh., l. c., p. 101. | — |
| 672. | <i>Vesta sumatrensis</i> | Gorh., l. c., p. 102. | — |
| 673. | <i>Diaphanes fuscipennis</i> | Gorh., l. c., p. 103. | — |

674. *Luciola cerea* Gorh., l. c., p. 103. Sumatra.
675. — *picea* Gorh., l. c., p. 104. —
676. *Telephorus viridanus* Gorh., l. c., p. 105. —
677. — *varicornis* Gorh., l. c., p. 106. —
678. — *angusticollis* Gorh., l. c., p. 106. —
679. — *sordidus* Gorh., l. c., p. 107. —
680. *Poëmius? depressus* Gorh., l. c., p. 107. —
681. *Silis hamatus* Gorh., l. c., p. 108. —
682. — *simplex* Gorh., l. c., p. 109. —
683. *Callimerus ornatus* Gorh., Id., Id., Note VII, p. 110. —
684. *Hister Ritsemæ* Marseul, Id., Id., Note IX p. 125. Libéria.
685. *Pantolamprus auratus* Candèze, Id., Id., Note XIII, p. 158. —
686. *Apogonia Ritsemæ* Sharp, Id., Id., Note XIV, p. 159. Java.
687. *Cicindela euthales* Bates, Ann. a. Mag. Nat. Hist., April 1882, p. 319. Mexique.
688. — *nephelota* Bates, l. c., p. 319. —
689. *Carabus Forreri* Bates, l. c., p. 320. —
690. *Cychrus (Scaphinotus) mexicanus* Bates, l. c., p. 320. —
691. *Euchræa flavogutta* Waterh., Id., Id., p. 321. Madagascar.
692. *Coptomia olivacea* Waterh., l. c., p. 322. —
693. *Stenotarsia (Linotarsia) plagiata* Waterh., l. c., p. 323. —
694. *Anochilia punctatissima* Waterh., l. c., p. 323. —
695. *Pycnobothris dejecta* Waterh., l. c., p. 324. —
696. — *quadrimaculata* Waterh., l. c., p. 324. —
697. *Coccinellopsis sobrina* Waterh., l. c., p. 325. —
698. — *laviventris* Waterh., l. c., p. 325. —
699. *Artelida aurosericea* Waterh., l. c., p. 326. —
700. *Leptocera rufofemorata* Waterh., l. c., p. 327. —
701. — *pulchra* Waterh., l. c., p. 327. —
702. *Batrisus capitatus* Raffr., Rev. d'Entom., 1882, 4, p. 73. Java.
703. — *angusticollis* Raffr., l. c., p. 74. —
704. — *pallidus* Raffr., l. c., p. 74. Nouv.-Guinée.
705. — *peruvianus* Raffr., l. c., p. 75. Pérou.
706. — *spinicollis* Raffr., l. c., p. 75. Abyssinie.
707. — *tricuspidatus* Raffr., l. c., p. 76. Nouv.-Guinée.
708. — *caudatus* Raffr., l. c., p. 77. Abyssinie.
- ATHEROPTERUS (n. g.) Raffr., l. c., p. 77 (à placer dans le voisinage des *Trichonyx*).
709. *A. longipalpis* Raffr., l. c., p. 78, pl. I, fig. 19, et pl. II, fig. 20. —

710. *Trichonyx filiformis* Raffr., l. c., p. 79. Java.
 711. *Euplectus Fauveli* Raffr., l. c., p. 79. Célèbes.
 712. — *major* Raffr., l. c., p. 80. Nouv.-Guinée.
 713. — *armipes* Raffr., l. c., p. 81. —
 714. — *cordicollis* Raffr., l. c., p. 81. Zanzibar.
 715. — *elegantulus* Raffr., l. c., p. 82. Nouv.-Guinée.
 716. — *femoratus* Raffr., l. c., p. 82. —
 717. — *antennatus* Raffr., l. c., p. 83. Abyssinie.
 718. — *clavatus* Raffr., l. c., p. 84. —
 719. — *crassus* Raffr., l. c., p. 84. Nouv.-Guinée.
 720. *Pachycorinus dimorphus* Fauvel, Id., Id.,
 p. 92. Nouvelle-Zélande.
 721. *Blosyrus ventricosus* Ancey, Naturaliste, IV, 7,
 1^{er} avril 1882, p. 54. Uzagara.
 722. *Pseudocolaspis albolineatus* Ancey, l. c., p. 54. Zanguebar.
 723. — *candens* Ancey, l. c., p. 54. Uzagara.
 724. *Micrantereus assimilis* Ancey, l. c., p. 54. —
 725. *Hiletus fissipennis* Ancey, l. c., p. 54. Zanguebar.
 726. *Hister pachysomus* Ancey, l. c., p. 55. Uzagara.
 727. *Hectarthrum Dorice* A. Grouv., Cucuj. nouv.
 Mus. civ. Gênes, p. 3 (Ann. Mus. civ. Genova,
 XVIII, p. 275), pl. VII, fig. 1. Nouv.-Guinée mér.
 728. *Ancistria Beccarii* A. Grouv., l. c., p. 5 (277),
 pl. VII, fig. 2. Iles Arou; Nouv.-Guinée.
 729. *Ino marginata* A. Grouv., l. c., p. 6 (278), pl. VII,
 fig. 3. Sumatra.
 730. — *macularis* A. Grouv., l. c., p. 7 (279), pl. VII,
 fig. 4. Nouv.-Calédonie.
 731. *Læmophlæus insignis* A. Grouv., l. c., p. 7 (279),
 pl. VII, fig. 5. Australie sept.
 732. — *lepidus* A. Grouv., l. c., p. 8 (280),
 pl. VII, fig. 6. Austr. sept., Bornéo, Singap.
 733. — *ovalis* A. Grouv., l. c., p. 9 (281),
 pl. VII, fig. 7. Bornéo.
 734. — *Gestroi* A. Grouv., l. c., p. 9 (281),
 pl. VII, fig. 8. Nouv.-Guinée mér.
 735. — *neglectus* A. Grouv., l. c., p. 10 (282),
 pl. VII, fig. 9. —
 736. — *humeralis* A. Grouv., l. c., p. 11
 (283), pl. VII, fig. 10. Iles Arou; Nouv-Guin.
 737. — *subtestaceus* A. Grouv., l. c., p. 12
 (284), pl. VII, fig. 11. —
 738. — *subgranulatus* A. Grouv., l. c., p. 12
 (284). Nouv.-Guinée mér.

739. *Læmophlæus dorsalis* A. Grouv., l. c., p. 13(285),
pl. VII, fig. 12. Iles Arou; Nouv.-Guinée.
740. — *Fauveli* A. Grouv., l. c., p. 14 (286),
pl. VII, fig. 13. Nouv.-Calédonie.
741. — *Beccarii* A. Grouv., l. c., p. 14 (286),
pl. VII, fig. 14. Iles Arou.
742. — *parvulus* A. Grouv., l. c., p. 15
(287), pl. VII, fig. 15. Australie.
743. *Psammæcus spinosus* A. Grouv., l. c., p. 17 (289),
pl. VII, fig. 17. Zanzibar.
744. — *piceus* A. Grouv., l. c., p. 17 (289),
pl. VII, fig. 18. Ternate.
745. — *Reitteri* A. Grouv., l. c., p. 18 (290),
pl. VII, fig. 19. Célèbes.
746. — *dentatus* A. Grouv., l. c., p. 18 (290),
pl. VII, fig. 20. Nouv.-Guinée.
747. — *angulatus* A. Grouv., l. c., p. 19
(291), pl. VII, fig. 21. Sumatra.
748. — *biangulatus* A. Grouv., l. c., p. 19
(291), pl. VII, fig. 22. Nouv.-Guinée.
749. *Silvanus orientalis* A. Grouv., l. c., p. 20 (292),
pl. VII, fig. 23. Célèbes; Sumatra.
750. — *Fairmairei* A. Grouv., l. c., p. 20 (292),
pl. VII, fig. 24. Zanzibar.
751. — *incequalis* A. Grouv., l. c., p. 21 (293),
pl. VII, fig. 25. Nouv.-Calédonie.
752. — *Albertisi* A. Grouv., l. c., p. 22 (294),
pl. VII, fig. 26. Nouv.-Guinée mér.
753. — *vitulus* A. Grouv., l. c., p. 22 (294),
pl. VII, fig. 27. Célèbes.
754. *Cathartus rugosus* A. Grouv., l. c., p. 23 (295),
pl. VII, fig. 28. Nouv.-Guinée.
755. *Attalus convolvuli* Abeille de P., Il Natur. Sicil.,
Aprile 1882, p. 145. Algérie.
756. — *Ragusæ* Abeille de P., l. c., p. 146. Sicile.
757. *Pelochrus pallidus* (Muls.) Abeille de P., l. c.,
p. 146. Espagne.
758. *Ebæus Mediterraneus* Abeille de P., l. c., p. 148.
Crimée; Sicile; Iles Baléares.
759. *Hypebæus tenuicollis* Abeille de P., l. c., p. 149. Syrie.
760. *Scapterus riparius* Gestro, Col. di Birmania, p. 5
(Ann. Mus. civ. Genova, XVIII,
p. 299), fig. Birmanie.
761. — *figuloides* Gestro, l. c., p. 7 (301), fig. Ind. orient.

762. *Thlibops puncticollis* Gestro, l. c., p. 8 (302), fig. Birmanie.
763. *Brachyonychus punctipennis* Gestro, l. c., p. 11 (305). —
764. *Trigonotoma Comotti* Gestro, l. c., p. 14 (308). —
765. *Triplogenius insignis* Gestro, l. c., p. 16 (310). Bornéo.
766. *Platyrhopalus Comotti* Gestro, l. c., p. 17 (311), fig. Birmanie.
767. *Apogonia squamulosa* Gestro, l. c., p. 20 (314). Célèbes.
768. — *flavipes* Gestro, l. c., p. 20 (314). Bornéo.
769. — *viridipennis* Gestro, l. c., p. 21 (315). —
770. — *opaca* Gestro, l. c., p. 21 (315). —
771. — *sericea* Gestro, l. c., p. 22 (316). Sumatra; —
772. *Tenerus marginipennis* Gestro, l. c., p. 22 (316). Birmanie.
773. *Nebria Gerdaldi* Paulino d'Oliveira, Rev. Soc. Instruc. Porto, Abril 1882, p. 147. Portugal.
774. *Zuphium Bocagei* Paulino d'Oliv., l. c., p. 153. —
775. *Dromius Putzeysi* Paulino d'Oliv., l. c., p. 154. —
- *Acmaeodera subprasina* Mars. var. *cuprea* Ancey, Naturaliste, 15 avril 1882, p. 62. Uzagara.
776. — *obscurata* Ancey, l. c., p. 62. Zanguebar.
777. *Melyris limbifera* Ancey, l. c., p. 62. Pays des Somalis.
778. — *marginicollis* Ancey, l. c., p. 62. —
779. *Amblystomus majoricensis* Schauf, Nunq. Otios., III, p. 545. Iles Baléares.
780. — *Macedo* Schauf., l. c., p. 546. Grèce.
781. — *ruficornis* Schauf., l. c., p. 546. Sicile.
782. *Masoreus ridiculus* Schauf., l. c., p. 552. I. Saint-Thomas.
- *Bembidium (Leja) bipunctatum* var. *laevifrons* Schauf., l. c., p. 552. Espagne.
783. *Prochelina rubella* Schauf., l. c., p. 552. Nouv.-Hollande.
784. *Clitopa opaca* Schauf., l. c., p. 553. Caffrerie.
785. *Hoplia misella* Schauf., l. c., p. 553. Espagne.
- *Aphanisticus elongatus*. Villa var. *canaliculatus* Schauf., l. c., p. 554. Europe.
786. *Lepyrus asperatus* Schauf., l. c., p. 554. Moldavie.
787. *Gronops vestitus* Schauf., l. c., p. 554. Abyssinie.
788. *Plinthus* (an nov. gen.) *jugifer* Schauf., l. c., p. 555. Népaül.
- *Carabus lusitanicus* F. var. *mediotuberculatus* Schauf., l. c., p. 557. Espagne.
- — *Bonvouloiri* var. *foveicollis* Schauf., l. c., p. 558. Batum.
- *Hydroporus flavipes* Ol. var. *octolineatus* Schauf., l. c., p. 559. Portugal.

- *Hydroporus flavipes* Ol. var. *Portalegrensis* Schauf.,
 l. c., p. 559. Portugal.
- — — — var. *manducus* Schauf.,
 l. c., p. 559. Sardaigne.
- — — — var. *montenegrinus* Schauf.,
 l. c., p. 559. Montenegro.
- — — — *distinguendus* Desbr. var. *estrellen-*
sis Schauf., l. c., p. 559. Espagne.
789. *Tefflus Chaudoiri* Raffr., Bull. Soc. Ent. France,
 12 avril 1882, p. 81. Abyssinie.
790. — *zebulianus* Raffr., l. c., p. 82. —
791. *Onthophagus neguss* Raffr., l. c., p. 82. —
792. *Carabus (Plectes) Komarowi* Reitter, Wiener Ent.
 Zeit., II Heft, p. 25. Caucase.
793. — — — *Lederi* Reitt., l. c., p. 27. —
- APODISTRUS (n. g.) Reitt., l. c., p. 30 (genre créé
 pour *Malthodes brachypterus* Kiesw.).
794. *Troglorrhynchus myops* Reitt., l. c., p. 31. —
- *Anthaxia lucens* Küst. var. *phaenicea* Ganglbauer,
 Id., III, p. 68. Syrie.
795. *Cerobates australasie* Fairm., Ann. Soc. Ent.
 France, 1881, 4, p. 463. Australie.
796. *Anomobrenthus hamatirostris* Fairm., l. c.,
 p. 465. Iles Viti.
- RHINOTROPIS (n. g.) Fairm., l. c., p. 467 (genre
 voisin des *Phlaeops*).
797. *R. cristiferus* Fairm., l. c., p. 467. —
798. *Ceresium grandipenne* Fairm., l. c., p. 472. —
799. — *impuncticolle* Fairm., l. c., p. 473. —
800. — *gracilipes* Fairm., l. c., p. 473. —
801. — *angustulum* Fairm., l. c., p. 474. —
802. *Oopsis griseocaudatus* Fairm., l. c., p. 480. —
803. — *dorsatus* Fairm., l. c., p. 481. —
804. — *discedens* Fairm., l. c., p. 481. —
805. *Exocentrus acutispina* Fairm., l. c., p. 482. —
- VITIBIA (n. g.) Fairm., l. c., p. 485 (genre voisin
 des *Metachroma*).
806. *V. rufoviolacea* Fairm., l. c., p. 485. —
- MALACOTHERIA (n. g.) Fairm., l. c., p. 486 (genre
 voisin des *Galeruca*).
807. — — *funerea* Fairm., l. c., p. 487. —
808. — — *strigiscutata* Fairm., l. c., p. 487. —
809. — — *lateritia* Fairm., l. c., p. 488. —
- METRIOIDEA (n. g.) Fairm., l. c., p. 489 (genre
 faisant partie du groupe des *Platyxanthites*).

810. *M. signatipennis* Fairm., l. c., p. 489. Iles Viti.
811. *Febra semiaurantiaca* Fairm., l. c., p. 490. —
812. — *varioloidea* Fairm., l. c., p. 490. —
813. *Cælophora atrolineata* Fairm., l. c., p. 491. —
814. *Blapisa Juliae* Allard, Id., Id., p. 505, fig. 65. Palestine; Egypte.
815. *Platyblaps creata* All., l. c., p. 525, fig. 84. Algérie?
816. *Tropideres Reyi* des Gozis, Feuille J. Nat., avril 1882, p. 67 (*T. brevicornis* Rey i. litt.). France.
— — *sepicola* v. *Combraliensis* des Gozis, l. c., p. 69. —
817. *Leucocera quadriguttata* Chevr., Bull. Soc. Ent. France, 26 avril 1882, p. 100. Saint-Domingue?
818. — — *ferruginea* Chevr., l. c., p. 100. —

REMARQUES SYNONYMIQUES.

EX WATERHOUSE :

(Ann. a. Mag. Nat. Hist., April 1882.)

Page 323 : *Coptomia elegans* Waterh. = *C. modesta* Waterh. var.

EX ANCEY :

(Naturaliste, 1^{er} avril 1882, p. 54.)

Anthia helluonoides Ancey est un *Acanthogenius*.

EX A. GROUVELLE :

(Cucuj. nouv. Mus. civ. Gènes — Ann. Mus. civ. Genova, XVIII.)

Page 4 (276) : *Hectarthrum brevifossum* Newm.
var. *cylindricum* Smith.
var. *australicum* Waterh.

Page 16 (288) : *Lathridius serrulatus* Montr. est un *Psammæcus*.

EX ABEILLE DE PERRIN :

(Il Natur. Sicil., Aprile 1882, p. 148.)

Ebæus Caspius Reitter (1879) n'est pas le *Caspius* (Becker i. litt.) Peyron (1877), mais bien le *bulbifer* Kolen. (1846) en synonymie duquel il doit être placé.

EX GESTRO :

(Coleot. Birman. — Ann. Mus. civ. Genova, XVIII.)

Page 15(309) : *Trigonotoma fulgidicollis* Casteln. fait bien partie du genre *Trigonotoma* et non du genre *Triplogenius*, comme l'avait supposé de Chaudoir.

EX SCHAUFUSS :

(Nunq. Otios., III, p. 545-560.)

Page 546 : *Amblystomus Solskyi* Reiche = *mauritanicus* Dej. var.

— 556 : *Carabus violaceus* var. *carbonatus* Ziegl. n'est pas la var. *candisatus*.

Carabus fulgens Charp. = VIOLACEUS var. *crenatus* aberr. a.

— 557 : *Carabus Caucasus* Motsch. (= *aurolimbatus* Mannh. i. litt. = *castaneipennis* Mén.) = CAR. MARGINALIS aberr. 2.

Les *Carabus brevis* Dej., *complanatus* Dej. et *latus* Dej. sont trois espèces distinctes.

Page 560 : *Lachnosterna obesa* Lec. et non *L. farcta* Lec. doit être mise en synonymie de la CRASSIMA Bl.

Feronia arctica Sahlb. (1879) = *infima* Maekl. (1868) = ARCTIOLA Chaud. (1868).

Carabus Theophilei Deyr. (1869) = SAPHIRINUS Crist. (1837) ;

C. scythus Motsch. (1847) = THORACICUS Germ. (1824) ; et *C. perforatus* Fisch. est une espèce distincte.

Scydmænus Nietneri Motsch. = GLANDULIFERUS Nietn.

S. brunnipennis Motsch. = PYRIFORMIS Nietn.

S. latipennis Motsch. = ANGUSTICEPS Nietn.

S. abyssinicus Reitt. = PINGUICULUS Gerst.

S. alatus Nietn., *femoralis* Nietn., *pselaphoides* Nietn., *intermedius* Nietn. appartiennent au genre EUMICRUS.

Eumicrus crassicornis Motsch. = CEYLANICUS Nietn. (Scydm.)

Scydmænus ovatus Nietn. est un CEPHENNIUM, en synonymie duquel il faut placer le *breviusculum* Motsch.

Quedius pineti Bris. = MAURORUFUS var.

Carpophilus quadripustulatus Er. = BIPUSTULATUS Heer var.

PROTETIA *brevitarsis* Lewis = SUBMARMOREA Burm. (Ceton.)

Nebria salina F. et L. = BREVICOLLIS var.

EX. GANGLBAUER :

(Wiener Entom. Zeitung., I, I, p. 5 et suiv.)

- Page 5 : *Prionus besicanus* Fairm. (1855) = *P. Lefeburei* Mars. (1856) = *P. persicus* Redt. (1850).
Cerambyx Manderstjernæ Muls. (1855) = *C. acuminatus* Motsch. (1852).
C. Mirbeckii Luc. (1842) et *C. Pfisteri* Stierl. (1864) ne sont que des races de *C. cerdo* L. (*heros* Scop.).
C. Welensii Küst. (1845) = *C. velutinus* Brull. (1832) et non *C. carinatus* Küst., qui est une espèce distincte.
C. orientalis Küst. (1845) = *C. dux* Fald. (1837).
C. nodosus Muls. (1863) = *C. intricatus* Fairm. (1848) = *C. nodicornis* Küst. (1845) = *C. nodulosus* Germ. (1817).
Purpuricenens Wredei Fisch. n'est pas une variété de *P. Köhleri* L., mais une race de *P. budensis* Goeze.
P. globulicollis Muls. (1839) paraît spécifiquement distinct de *P. Köhleri* L.
P. Fettingi Schauf. (1871) = *P. ferrugineus* Fairm. (1851).
Hylotrupes Kozirowiczii Desbr. (1872) = *H. bajulus* L.
— 6 : *Oxypleurus scutellaris* Costa (1855) = *O. Nodieri* Muls. (1839).
Allocerus nitidus Fairm. (1864) = *A. fulvus* Muls. (1863) = *A. mæsiacus* Friv. (1837-38).
Clytus scalaris Brull. (1832) est spécifiquement distinct de *Cl. Bobelayei* Brull. (1832).
C. variabilis Motsch. (1859) est une race locale de *C. floralis* Pall.
C. zebra Lap. et Gory (1841), *C. floralis v. abruptus* Kraatz (1870), et *v. pruinosis* Kraatz (1870) sont des variétés de cette race.
C. clavicornis Reiche (1860) = *C. arietis* L. var.
C. lugens Küst (1848) = *C. glaucus* Fabr. = *C. glabromaculatus* Goeze (1777) var.
C. Köchlini Hagb. = *Neoclytus araneiformis* Oliv.
C. Stierlini Tourn. est une variété de *C. speciosus* Schneid. (*semipunctatus* F.).
Leptidea minuta Motsch. = *L. brevipennis* Muls. ♂.
Stenopterus præustus Fabr. (1792) est spécifiquement distinct de *S. rufus* L.
— 7 : *S. procerus* Costa (1856) = *S. flavicornis* Küst. (1846).

Page 7 : *Necydalis calopoides* Germ. n'est pas un *Stenopterus*, mais bien *Oncomera femorata* Fabr.

Parmena algerica Casteln. (1840), *P. inclusa* Muls. (1863), *P. Solieri* Muls. (1839), et *P. Dahlii* Muls. (1863) = *P. hirsuta* Küst. (1844) ne sont que des races de *P. pubescens* Dalm. (1817).

Dorcadion Abeillei Tourn. (1872) = *D. laqueatum* Waltl. (1838) var.

D. balcanicum Tourn. (1872) = *D. exornatum* Friv. (1835) var.

D. Iserni Per. Arc. (1868) = *D. Lorquini* Fairm. (1855).

D. Mulsanti Brisout. (1866) = *D. Spinolæ* Dalm. (1817).

D. castilianum Chevr. (1862) = *D. Seoanei* Graëlls (1858). — *D. Brannani* Schauf. semble être une race alpine de cette espèce.

Herophila obsoleta Fairm. (1859) = *H. tristis* L. (*funesta* F.).

— 8 : *Monochamus sartor* Thoms. (1866) semble distinct de *M. sartor* Fabr., mais est *M. quadrimaculatus* Motsch. (1845), mis à tort en synonymie de *M. sartor* Fabr.

M. Heinrothi Cederhj. (1798) = *M. sutor* L. ♀.

M. Rosenmülleri Cederhj. (1798) = *M. pelli* Germ. ♀ (*sutor* L. var.), ou *M. sartor* F. ♀ var. sans ailes.

M. peregrinus Gradl (1881) = *M. saltuarius* Gebl. (1848).

M. pistator Germ. (1818) et *M. lignator* Fald. (1837) ne sont que des races de *M. galloprovincialis* Oliv.

— 9 : *Acanthocinus alpinus* Redt. (1849) = *A. sibiricus* Motsch. (1860) = *A. carinulatus* Gebl. (1833).

Astynomus hirsitulus Fald. (1837) est plutôt une *Hoplosia* qu'un *Exocentrus*.

Exocentrus Revelierei Muls. = *E. adspersus* Muls. var.

Agapanthia insularis Gautier (1870) = *A. asphodeli* Latr. (1804).

A. acutipennis Muls. (1863) = *A. lineatocollis* Donovan.

A. decora Kryn. (1834) = *A. cynaræ* Germ. (1817).

A. pyrenæa Bris. (1863) = *A. angusticollis* Gyllh.

A. cæruleipennis Friv. = *A. chalybea* Fald., qui n'a rien de commun avec *A. cyanea* Herbst.

A. consobrina Chev. = *A. cardui* L. var.

Tetrops nigra Kraatz = non *gilvipes* Fald., mais *T. præusta* L. var.

- Page 9 : *Oberea euphorbiæ* Germ. est une espèce bonne.
O. bicolor et *O. melitana* Reiche (1877) ne sont que des variétés de *O. erythrocephala* Fabr.
Phytoëcia Blessigi Moraw. et *P. Jourdani* Muls. sont des variétés de *P. rubrocincta* Goeze.
- 10 : *P. excelsa* Stierl. (1877) = *P. millefolii* Adams (1817).
P. bivittis Kraatz i. litt. = *P. vittipennis* Reiche (1877).
P. murina Mars (1869) = *P. rufipes* Oliv. (1795).
P. Baccueti Brull. (1832) = *P. rufimana* Schreck. var.
P. orbicollis Reiche (1858) = *P. scutellata* Fabr.
Xylostylon Lederi Reitt. (1879) = *Enoploderes sanguineus* Fald. (1837).
Strangalia lanceolata Muls. = *S. bifasciata* L. var.
Leptura simplonica Stierl. (1880) = *Acmaeops septentrionis* Thoms. (1866).
L. excelsa Costa (1863) = *L. rufa* Brull. (1832).
L. pallidipennis Tourn. (1872) = *L. pallens* Brull. (1832).
L. melanota Fald. = *L. dubia* Scop ♀ var.
L. (Vadonia) grandicollis Muls. (1863) = *L. bisignata* Brull. (1832).
- 11 : *L. (Vadonia) saucia* Muls. et God. est une race (?) de *L. unipunctata* Fabr.
L. (Vadonia) adusta Kraatz = *L. Steveni* Sperk.
L. (Vadonia) globicollis Desbr. (1870) = *L. laterimaculatus* Mots (1875) = *L. Steveni* Sperk. (1835).
L. litigiosa Muls. n'est peut-être qu'une race de *L. Steveni* Sperk.
L. (Anoplodera) rufiventris Tourn. = *rufipes* Schall. var.
Grammoptera bicarinata Arnold = *livida* Fabr. var.
Judolia tibialis Mars. (1876) = *Cortodera alpina* Mén. (1832).
Grammoptera analis Herr.-Schäff. = *G. variegata* Germ.
- 12 : *Fallacia longicollis* Muls., *mingrelica* Kraatz et *Lederi* Kraatz sont des variétés de *Pidonia elegans* Fald.
Leptura oblongomaculata Buq. et *L. trisignata* Fairm. sont deux espèces distinctes.

EX REITTER :

(Wien. Ent. Zeit., II u. III.)

- 26 : *Carabus protensus* Schaum (1864) = *C. compressus* Chaud. (1852).

- Page 67 : *Brontes humeralis* Fald. = *Hyliota planata* L.
Merophysia ovalipennis Coxe = *orientalis* Sauley.
Anthicus tæniatus Baudi = *cinctulus* Marseul.
Xyletinus discolor Fald. = *Ptilinus aspericollis* Mén.
Utomida picta Men., Fald. = *Alphitophagus quadri-*
pustulatus Steph.
Mycetocharis croceipes Weise = *M. gracilis* Fald.
Gonodera (Eubæus) viridis Allard = *G. pulcherrima*
Fald.
Tropiphorus cæsius Stierl. (1881) = *cæsius* Friv.
(1879).
Meira Caucasica Stierl. = *Platytarsus cruciatus* Stierl.
Xylostylon Lederi Reitt. = *Enoploderes sanguineus*
Fald.
Niptus fuscus Gradl. = *griseofuscus* var.
Abatrisops Reitt. = *Tribatus* Motsch.
Paramecosoma balearica Schauf. = *Leucohimatium*
elongatum Erichs.
— 68 : *Attagenus unifasciatus* Fairm. = *cinnamomeus* Roth.
= *subfasciatus* Chevr. = *gloriosus* Fabr.
Reicheia mirabilis Putz. = *R. frondicola* Reitt.
Anophthalmus acherontius Schauf., = *A. Reitteri*
Miller.
Bathyscia Erberi Schauf. n'est pas *celata* Hampe.
Gonatocerus communis Schauf. = (*Bryaxis*) *basalis*
King.
Cucujus occinatus Lewis = *C. Grouvellei* Reitt.
Bryaxis coronatus Westw. et *B. auritulus* Westw.
sont des *Batrisus*.
Mastiger Motsch. = *Articerus* Dalman.
Claviger Hageni Motsch. est un *Articerus*.
Pseudomicrus Motsch. = non *Scydmænus*, mais
Eumicrus.
Distaphila Pascoe = *Colydodes* Motsch.

EX GANGLBAUER :

(Wien. Ent. Zeit., III, p. 68.)

Perotis longicollis Kraatz = *P. cuprea* Hampe.

Anthaxia ephippiata Redt. = *A. brevis* Lap.

EX FAIRMAIRE :

(Ann. Soc. Ent. France, 1881, 4.)

- 472 : *Cacodæmus guttaticole* = *simplex* var. — Le *C. oli-*
dum est tout différent de *C. simplex*.

Page 485 : *Rhyparida formosa* Baly pourrait rentrer dans le genre *Vitibia* Fairm.

EX ALLARD :

(Ann. Soc. Ent. France, 1681, 4.)

- 495 : Il n'y a pas de raison pour remplacer le nom de *Blapisa convexa* Reiche par *B. mutata* Gemm.
- 505 : *Blapisa carbo* Sol. n'est pas la *Jaegeri* Humm., mais plutôt *acuminata* (Solieri) ♀.

COMMUNICATIONS DIVERSES.

M. L. Ganglbauer (Vienne, III, Geusaugasse, 7), désirant étudier les espèces paléarctiques et méditerranéennes du genre *Anomala* Sam., s'adresse aux Coléoptéristes, afin d'obtenir des matériaux pour cette étude.

P.-S. — Avertis trop tard de l'apparition du travail de M. Sharp sur les Dytiscides, nous ne pourrons donner que dans le prochain numéro de la *Revue* la liste des espèces nouvelles décrites dans cet ouvrage, ainsi que les remarques synonymiques.

